

Taxon Vitis vinifera Olsava

Název taxonu	Vitis vinifera Olsava
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Olšava’ (Ol)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	KO-BO 39/28
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	česká stolní odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Kossuth Lajos (Košťutův hrozen)’ x ‘Boskolena’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní červeně zbarvená odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	střední bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, hnědošedé barvy, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločnaté, se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrážitý, vespod mírně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je velký, kuželovitý, hustý; bobule je kulatá, středně velká, modročervené barvy
Semena	středně velká, s dlouhým tupě zašpičatělým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy vhodná pro všechny typy půd
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení snáší všechny typy vedení
Řez dlouhý i krátký řez
Podnož sprašové a hlinité půdy Kober 5 BB, slínovité a těžké půdy Kober 125 AA, pro vlhčí humózní půdy dobře zásobené vodou T 5C

Užitné vlastnosti

Použití modrá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci střední až nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost středně raná, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína bobule jsou chruplavé, neutrální chuti, sladší

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 126\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

