

Taxon Brassica chinensis

Název taxonu	Brassica chinensis
Vědecký název taxonu	Brassica chinensis
Jména autorů, kteří taxon p...	Juslen
Český název	čínské zelí
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. chinensis
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Dálhy východ
-------------------------------	--------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro listovou růžici

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytváří polovzpřímenou nebo přizemní listovou růžici
Kořen	mělce kořenící
Listy	silně řapíkaté, drsný povrch, mírně ochlupený
Květenství	květní lodyha rozvětvená, 0,8 m vysoká, květenství řídky prodloužený hrozen
Květy	žluté nebo bílé
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	šešule
Semena	HTS 3,2 - 3,5 g
Vytrvalost	jednoleté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete při nízké teplotě 8 °C a suchu
-------------------------	--------------------------------------

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen
Doba zrání - poznámka	za 5 - 6 týdnů po výsadbě, vegetační doba 60 dní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	nenáročný na sluneční svit
Faktor vody	u porostu s předpěstované sadby nutná doplňková zálaha
Faktor půdy	řepařské, lehčí nebo středně těžké, vododržné, propustné s dostatkem živin, pH neutrální nebo slabě zásadité

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	neinfekční tečkovitost, bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáiová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květ ilka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), západníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlomorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	0,4 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)