

Taxon Muehlenbeckia complexa

Název taxonu	Muehlenbeckia complexa
Vědecký název taxonu	Muehlenbeckia complexa
Jména autorů, kteří taxon p...	(A. Cunn.) Meisn. (1841)
Český název	mühlenbeckie
Synonyma (zahradnicky pou..	Polygonum complexum A. Cunn.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Muehlenbeckia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holantarktická květenná říše a Novozélandská oblast
Biogeografické regiony - po..	Nový Zéland

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem, Listnatý keř stálezelený a Liána stálezelená
Pěstitelská skupina - pozná..	Částečně opadavá dřevina
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivě ovíjivý keř, až 5 m vysoký / dlouhý
Výhony	drátovité; tenké, hustě větvené, purpurově hnědé; někdy v uzlinách kořenující, letorosty jemně bradavičnaté, olýsávající nebo pýřité,
Listy	tvar listů proměnlivý, vejčitý, eliptický až (téměř) okrouhlý nebo houslovitý, 0,5–1,5 × 0,5–1,5 cm velké, báze srdčitá nebo kulatá či uťatá, na vrcholku špičaté nebo vykrojené, celokrajné, oboustranně lysé nebo naspodu podél středního žebra jemně pýřité
Květenství	Mírná zálivka obzvlášť v zimě. Vhodné letnění.
Květy	květy zelenobílé či žlutavě zelené, v klasech 2,5–3 cm dlouhých, terminálních a úžlabních, často ale jen se 2–3 květy; tyčinek 8, tepaly kopinatě vejčité až obvejčité a 2–4 mm dlouhé, za plodu zvětšené, prašníky růžové až purpurové, vejčité až eliptické
Plody	bílé kulovité bobule
Semena	černé, lesklé, trojúhlé, asi 2 mm velké

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé stanoviště s rozptýleným světlem nebo až polostín
Faktor tepla	teplý až chladný skleník; velmi přizpůsobivá rostlina; teplota v létě 20-25 °C, v zimě okolo 8-15 °C, krátkodobě i poklesy k -5°C
Faktor vody	rovnoměrně vlhký substrát, při chladném přezimování omezená zálivka; při teplém přezimování rovnoměrná zálivka a vysoká vzdušná vlhkost
Faktor půdy	hlinitý humózní substrát, pH 5,8 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	vhodná jako půdní kryt nebo do podrostu pod vyšší kmínkové dřeviny nebo i jako náhrada trávniku; treláže a do závěsných nádob

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky, Hřížení, Množení oddělky a Množení odkopky
Množení - poznámka	řízkování v průběhu celého roku, nenecháváme řezné plochy zavadnout; vhodnější je dělení trsů
Odrůdy	Nana' - výhony spleťité, listy drobné, květy úžlabní, žlutozelené; výrazný půdní pokryv; var. microphylla - husté keře vysoké až 60 cm; listy nepočetné, okrouhlé a velmi malé; f. trilobata - listy až 2.5 cm dlouhé, široce vejčité, výrazně laločnaté, špičaté, báze kulatá až srdčité; 'Top Secret Maori' - kompaktní vzrůst, listy lesklé, do 1,5 cm velké

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (studený skleník)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/26000044?tab=references http://www.tropicos.org/Name/26000044?tab=chromosomecounts
--------	--

Grafické přílohy

