

Taxon Vitis coignetiae

Název taxonu	Vitis coignetiae
Vědecký název taxonu	Vitis coignetiae
Jména autorů, kteří taxon p...	Pulliat ex Planch.
Český název	réva japonská, réva Coignetové
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní Japonsko, Korea, Sachalin

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavá liána, výška běžně do 8 m, někdy až kolem 20 m
Výhony	letorosty rezavě hnědě plstnaté a slabě rýhované
Pupeny	střídavé
Listy	listy okrouhlé až okrouhle vejčité, 10–30 cm velké, mělce 3–5laločné, nepravidelně a lehce zubaté, svrchu matně zelené a svraskalé, naspodu rezavě až šedě nebo hnědě plstnaté, na podzim šarlatové až karmínově červené
Květenství	květy v plstnatých, 6–13 cm dlouhých latách
Plody	plody 8–12 mm tlusté, tmavopurpurové, tmavofialové až černé, ojíněné, nejedlé

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	choulostivý, oblast I-II
Faktor vody	středně vlhké nebo vlhčí půdy

Faktor půdy středně živné, hlinité, těžké půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vhodné vysadit k větším konstrukcím

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	je okrasná především listem
Použití	popínavá rostlina, pro svou mohutnost je rostlina vhodná na velké konstrukce jako například stožáry, fasády, opěrné zdi nebo velké pergoly
Choroby a škůdci	netrpí chorobami ani škůdci

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky a Očkování
Množení - poznámka	množíme ze semene, dřevitými odřezky i očkovými odřezky jako všechny révy