

Taxon Vitis vinifera Jubilej

Název taxonu	Vitis vinifera Jubilej
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Jubilej Žuravlja’ (JŽ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Jubilej Žuravela, Jubileum Žuravlja
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o uzbekou odrůdu, vznikla křížením odrůd (‘Nimrang’ x ‘Karmannyj’) x ‘Muscat de Saint-Vallier’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má slabší až středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, červenohnědé, občas hůře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, šířejí otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velmi velký, kuželovitý, spíše řidší hrozen; bobule je kulatá, velká až velmi velká, tmavorůžové barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažen
Podnož na chudších půdách Kober 125 AA i 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

Užitné vlastnosti

Použití červená stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci odolnější k houbovým chorobám
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 5-8 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízků i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je bílé barvy, masitá, chuť neutrální

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 128\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

