

Taxon Lilium martagon

Název taxonu	Lilium martagon
Vědecký název taxonu	Lilium martagon
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	lilie zlatohlavá
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lilium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po...	je evropským a asijským druhem s širokým areálem rozšířením od jižní Francie a Portugalska až na východ Rusku, na Sibiři a do Turecka.

Zařazení

Fytocenologický původ	světlé listnaté lesy a jejich okraje, subalpinské louky,
Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Životní forma - poznámka	zatahující cibulovina; okrouhlá nažloutlá cibule o Ø cca 6 cm
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Kořen	svazčité kořeny vyrůstající z věnce kořenů
Výhony	výška stonku se v přírodě pohybuje okolo 100 cm, v kultuře bývá i vyšší (až 180 cm).
Pupeny	umístěny na podpučí cibule
Listy	široce kopinaté listy uspořádané v přeslenech
Květenství	hrozen - běžně vykvétá 5-10 květů, u rostlin pěstovaných v zahradách jich může být až 50
Květy	nící květy turbanovitého tvaru, Barva květů je velmi variabilní v odstínech růžové s fialovými tečkami i bez nich.
Plody	tobolka
Vytrvalost	na příznivých stanovištích vytrvalá
Dlouhověkost	na příznivých stanovištích dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování - poznámka	neremontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor vody	přiměřeně vlhká, v zamokřených půdách mohou cibule vyhnívat
Faktor půdy	půda pro jejich pěstování však musí být dobře propustná, protože cibule většiny druhů jsou velmi citlivé na přemokření především v době vegetačního klidu.
Faktor půdy - vápnostřežný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru a VPz - Volné plochy záhonového charakteru
Použití	vhodná kombinace s trvalkami podobných nároku např. Alchemilla, Astrantia, Geranium . mezofytního původu aj.
Růstové i jiné druhově spec..	na dno výsadbové jamky je při výsadby vhodné nasypat nejprve vrstvu hrubšího písku či drobné ho štěrku jako drenáž. Cibule se vysazují poměrně hluboko. Hloubka výsadby by měla odpovídat 3-4 násobku výšky cibule. Rostlina má tak dostatek prostoru na vytvoření bazálních kořenů a cibule je ve větší hloubce vystavena menším teplotním výkyvům. Nejvhodnější dobou pro výsadbu a přesazování je začátek podzimu, kdy je půda ještě teplá a rostlina má možnost dobře zakořenit. Při jarní výsadbě je nutné cibule udržet co nejdéle v chladném prostředí, aby příliš nerašily a pak je vysadit již do prohřáté půdy. Ke vzrůstnějším taxonům je vhodné již při výsadbě umístit kolík, který bude moci být v době vegetace vyměněn za dostatečně vysokou oporu bez rizika, že dojde při jejím zapichování k poškození cibule. Vhodná vzdálenost cibulí od sebe je závislá na vzrůstnosti rostlin. Každý stonek by měl mít okolo sebe dostatek prostoru, aby mohlo náležitě vyniknout květenství a dobře osychaly listy, náchylné k houbovým chorobám.
Doporučený spon pro výsad..	záleží od kompozičního záměru.

Grafické přílohy

