

Taxon *Pseuderanthemum carruthersii*

Název taxonu	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i>
Vědecký název taxonu	<i>Pseuderanthemum carruthersii</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Seem.) Guillaumin
Český název	(syn. <i>P. atropurpureum</i>)
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Eranthemum atropurpureum</i> W. Bull; <i>Pseuderanthemum carruthersii</i> var. <i>atropurpureum</i> (W. Bull) Fosberg, <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> (W.Bull) Radlk., <i>Pseuderanthemum atropurpureum</i> (W. Bull) L. H. Bailey
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Pseuderanthemum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Polynézska oblast
Biogeografické regiony - po..	Polynésie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	přímé, řídké a málo větvené keře nebo malé stromy, 0,9-1,5(-4) m vysoké
Výhony	výhony 4hranné, lysé
Listy	vstřícné; řapíky 5-18 mm dlouhé, téměř celé lysé; čepele eliptické, vejčitě eliptické až vejčité, 4,5-14,5 × 4,5-6,5 cm velké, špičaté, někdy zahrocené, báze protažená, celokrajné, purpurové až tmavě kovově zelené s bílými, žlutými a šedozelenými skvrnami, celokrajné, oboustranně lysé
Květenství	květy v terminálních a úžlabních vrcholičnatých latách s květy v téměř přisedlých svazečcích většinou po 3; květenství a vřetena lysá
Květy	stopky květů až 5 mm dlouhé, stopky květenství až 7 cm, vřeteno až 13 cm dlouhé, listeny prodloužené, spodní asi 5-7 × 2-3 mm velké, horní menší; kalich 5četný, laloky stejné a šídlovité, 2-3 mm délka; koruna bílá, na bázi růžovočerveně nebo purpurově skvrnitě, trubka cylindrická, 10-12 mm délka, lem 20-22 mm široký, laloky

eliptické až 8-10 × 5-8 mm velké; tyčinky vyniklé, patyčinky 1,5-2 mm dlouhé

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlé stanoviště; po otužení snáší dobře i přímé slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplý skleník; teplota v létě 18-20 °C, při chladnějším přezimování minimálně 13 °C
Faktor vody	celoročně rovnoměrná zálivka, při chladném přezimování omezená; vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	propustný, středně těžký a živný substrát s podílem rašeliny a minerální zeminy; pH 5,8 - 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	v teplém skleníku a zimní zahradě výrazná solitéra okrasná listem; v suchém a teplém prostředí použitelná jako krátkodobá hrnkovka okrasná listem
Choroby a škůdci	puklice

Množení

Množení	Vegetativní, Vrcholové řízky a Osní řízky
Odrůdy	Variegatum' (synonymum 'Tricolor') - listy bronzově purpurové; růžové a krémově žlutě pestré; květy fuchsinové a červené; další druhy dříve vyčleňované pod varietou jako Pseuderanthemum carruthersii: Pseuderanthemum sinuatum (syn. Pseuderanthemum carruthersii var. sinuatum) - listy úzce kopinaté, nepravidelně laločnaté, 3-4 x 0,5-1 cm, světle žlutozelené; P. reticulatum (syn. Pseuderanthemum carruthersii var. reticulatum) - listy úzce kopinaté, 5-7 x 1,2-1,8 cm, pevné kožovité, žlutě prokreslená žilnatina; P. alatum (syn. Pseuderanthemum carruthersii var. alatum) - listy přisedlé, okrouhlé, průměr 4-5 cm, kovově lesklý střední pruh na měděně zabarveném listu

Celky sbírek

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=26313>
- <http://www.tropicos.org/Name/102845>

Grafické přílohy



