

Taxon Brassica oleracea var. gongylodes

Název taxonu	Brassica oleracea var. gongylodes
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. gongylodes
Jména autorů, kteří taxon p...	L., DC, L., Markgr.
Český název	kedlubna
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	convar. acephala var. gongylodes
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Košťálová zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro osní hlízu

Popisné a identifikační znaky

Habitus	tvar hlízy je kulovitý až ploše kulovitý
Kořen	nejslabší kořenový systém ze všech košťálovin
Listy	dlouze řapíkaté, na tenké bázi rozšířené, u báze řapíku je patrný žlábek, čepel mírně skadeřená, na okraji vroubkovaná, mírně laločnatá
Plody	dvoupouzdrá šešule s charakteristickým zobanem
Semena	kulovitá, tmavě hnědá, HTS 3,5 - 4,8 g
Vytrvalost	dvouletá

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Říjen
Doba zrání - poznámka	sklizeň : Raná 15. V. - zač. VI., Letní VI. - VIII., Pozdní VIII. - X.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplota předpěstování 14 - 17°C, následně 12 - 14°C
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité naplaveniny s dostatkem humusu (4,5 a více procent)

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáriová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květílka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), záprředníček polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	raná 0,25 x 0,25 m, letní 0,3 - 0,4 x 0,3 - 0,4, pozdní 0,4 x 0,4 m

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)