

# Taxon Vitis vinifera Veltlinske cervene

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Veltlinske cervene                                 |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                                                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                                             |
| Odrůda                         | ‘Veltlínské červené’ (VČ)                                         |
| Český název                    | Réva vinná pravá                                                  |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Roter Veltliner, Crvena Valtelina, Tarant červený, Ryvola červená |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)                           |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                                            |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                                          |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                                             |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                  |
| Biogeografické regiony - po.. | původ odrůdy je pravděpodobně rakouský, křížení však není známo |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Mošťová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má středně bujný až bujný růst                                                                                                                                        |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, žlutavě hnědé, občas hůře vyzrávající                                                                                                            |
| Pupeny                     | středně velké, zahrocené                                                                                                                                                          |
| Listy                      | středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, velmi jemně vrásčitý, vespod plstnatý |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                                                              |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                                           |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                                                                       |
| Plody                      | středně velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, středně velká, šedočervené barvy, ve stínu nazelenalá                                                         |
| Semena                     | velká, hruškovitá, s delším zobáčkem                                                                                                                                              |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                                  |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ‘Veltlínské červené rané’ (VČ má však pozdější zrání)                                                                                                                             |
| Vytrvalost                 | ano                                                                                                                                                                               |
| Dlouhověkost               | ano                                                                                                                                                                               |
| Doba rašení                | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                               |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
|----------------------|--------|

Konec doby kvetení Červen

## Doba zrání

Začátek doby zrání Zář  
Konec doby zrání Říjen

## Nároky na stanoviště

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                         |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost slabší    |
| Faktor vody              | snáší dobře i půdy kamenité a suché                       |
| Faktor půdy              | lépe vlhčí hlinité a hlinitopísčité půdy                  |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                         |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                       |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední i vysoké vedení                                                                                                  |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez                                                                                |
| Podnož          | do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 i T 5C, do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože LE-K/1, Kober 125 AA i 5 BB |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína                        |
| Choroby a škůdci | nižší až střední odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči |
| Plodnost         | středně pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)                    |

## Množení

|                             |                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                        |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací                                        |
| Popis vína                  | víno má jemnou charakteristickou odrůdovou vůni i chuť, avšak bez zvláštního výraznějšího buketu |
| Doporučená technologie vína | jakostní a přívlastková bílá vína, cuvée                                                         |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

## Ostatní

Odkazy

- [http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav\\_556/atlas\\_reva/atlas\\_reva.pdf](http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf)

## Grafické přílohy

