

Taxon Vitis vinifera Neuburske

Název taxonu	Vitis vinifera Neuburske
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Neuburské’ (Ng)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Neuburské, Neuburger, Fehér Neuburgi, Novogradski
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patrně rakouská odrůda, pravděpodobně vznikla nahodilým křížením odrůd ‘Veltlínské červené’ x ‘Sylvánské zelené’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je hnědé, silnější a po celé délce čárkované a tečkované
Pupeny	velké, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, tři až pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; čepel vrásčitá, vespod mírně ochlupená
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký kuželovitý hrozen, hustý, s krátkou stopkou; bobule je kulatá, středně velká, zelená až zelenožlutá, tečkovaná
Semena	středně velká, elipsoidní, zobáček je zašpičatělý
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody vhodné jsou i sušší a kamenité půdy
Faktor půdy spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží, není náročná na půdu, nesnáší přehnojení dusíkem - sprchává

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož na hlubokých úrodných půdách SO 4 či T 5C, na lehčích půdách CR 2 či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci citlivá zejména na houbové choroby, napadána obaleči
Plodnost středně pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit také hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína víno má svěží kyselinu, ovocně kořenitou vůni a chuť po ořechu, grepu či banánu
Doporučená technologie vína jakostní a přívlastková bílá vína, kupáže, sekty

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

