

Taxon Ribes nigrum ‘Nigra’

Název taxonu	Ribes nigrum ‘Nigra’
Vědecký název taxonu	Ribes nigrum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Nigra’
Český název	meruzalka černá
Synonyma (zahradnický pou..	Ribes cyathiforme, Ribes pauciflorum, Botrycarpum nigrum, Grossularia nigra
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Ribes

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČR

Zařazení

Fytocenologický původ křížení odrůd ‘Holandský černý’ x ‘Goliath’
Pěstitelská skupina Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: polovzpřímený, středně zahuštěný
Listy	velké, hladké, dosti matné
Květy	miskovité, korunní plátky kopistěovité, žluté (částečně samosprašná až cizosprašná)
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	hrozen dlouhý, průměrně 8-14 velkých bobulí/hrozen, černé, nasládlé, aromatické
Možnost záměny taxonu (+..	Polovzpřímený, pravidelný, středně hustý keř s tlustými kosterními větvemi, dlouhý hrozen s velkými černými bobulemi, převážně kulovitěho nezploštělého tvaru.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, od 25. dubna do 10. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka raná až středně raná, konec června až začátek července

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodné teplé polohy, náročná na stanoviště
Faktor půdy	vhodné těžší, průměrně vlhké, živné půdy, náročná na stanoviště

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	možné pěstovat v obou tvarech, obvyklejší je keř
Řez	náročná na prosvětlovací řez

Užitné vlastnosti

Použití	výrobá šťáv a marmelád
Choroby a škůdci	středně náchylná na rez vejmutovkovou
Růstové i jiné druhově spec..	středně bujný
Plodnost	nastupuje ve 3. - 4. roce po výsadbě, střední (2,2-3,0 kg/keř)

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Grafické přílohy

