

Taxon *Dracaena surculosa*

Název taxonu	Dracaena surculosa
Vědecký název taxonu	Dracaena surculosa
Jména autorů, kteří taxon p...	Lindley (1928) - v kultivaci od 1830...
Odrůda	‘Florida Beauty’
Český název	dracéna výhonkatá
Synonyma (zahradnický pou..	Dracaena godseffianaSand.ex Mast.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. maculata J.D.Hook.
Nadřazená kategorie	Dracaena

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Konžsko-guinejská oblast
Biogeografické regiony - po..	v povodí Nigeru z Kamerunu po Guineu a Sierra Leone

Zařazení

Fytocenologický původ	efylofyt - vlhké skály a břehy vodních toků v galeriových lesích lesích, narušená stanoviště podél cest, od pobřeží k 800 m n.m.
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímené nebo přepadavé keře až 8 m vysoké, s přeslenitě olistěnými rákosovitými stonky
Kořen	rumělkově zbarvené, často zhlíznatělé adventivní kořeny
Výhony	tenké, bambusovité, chudě větvené, přeslenitě olistěné
Listy	hrotnatě elipčité, stěží přes 0.1 m dlouhé, leskle zelené, často nepravidelně bledě skvrnitě
Květenství	terminální (někdy zdánlivě úžlabní) klubíčka na tenkých nevětvených stopkách
Květy	oboupohlavné, bílé nebo zelenavé, vonné, stejnoobalné s lineárními, do poloviny trubkatě srůstajícími tepaly, trojčetné, diplostemonické
Plody	kulovité, často laločnatě žebematé, ve zralosti rumělkové třísemenné bobule
Semena	nepravidelně diskovitá, bělavá nebo světle hnědá
Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelná s podobnou <i>D. ovata</i> Ker.Gawl. (výrazněji

	pseudořapíkaté listy, zkrácené stopky květenství) nebo s extrémně proměnlivou <i>D. camerooniana</i> Bak. (není striktně přeslenitá, s poniklými květenstvími) - obě bez pestrolistých klonů
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
Konec doby kvetení	Březen
Doba kvetení - poznámka	v domovině zpravidla sezónní kvetení v závislosti na srážkovém období; v kultivaci kvete vzácně

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na množárnách 2-6 klux, dopěstování 22-36 klux; k udržení kvality v bytech nejméně 2 klux
Faktor tepla	řízkování 24°C, produkce v létě 20°C a více, dopěstování při 16°C-20°C
Faktor vody	voda nejlépe středně tvrdá (do 30°dH), soli max. 1000 mg na litr; přihnojování týdně v zálivce 0.1-0.2% NPK
Faktor půdy	propustný lehký substrát - provzdušněný borkou, perlitem; pH 6.0-7.0 (černání listů nad 7.5!), EC do 1.4-2.4 mS/cm, 3-4 kg NPK / m ³

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	početné askomycety (<i>Colletotrichum</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> ; <i>Leptosphaeria</i> , <i>Mycosphaerella</i> , <i>Phomatospora</i>); ze škůdců štítenky (<i>Pseudococcus</i> , <i>Pulvinaria</i>), roztoči (<i>Tarsonemus</i> , <i>Polyphagotarsonemus</i>), molice (<i>Trialeurodes</i>), třásněnky (<i>Frankliniella</i>), háďátka (<i>Meloidogyne</i> , <i>Cricanemella</i> a další)
Doporučený spon pro výsad..	produkce: z vrcholových řízků 36-44 hrnky na m ²

Množení

Množení	Řízkování, Dřevité řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Mezihrnky	vrcholové řízky do 8 cm hrnků s přehrnkováním do 14 cm nebo větších hrnků (pro menší zboží kultura bez mezihrnků)
Konečné hrnky	10-11 cm hrnky (pětiměsíční kultivace) a větší- dle velikosti produktu
Květní tvorba	exaktní data nedostupná, nicméně pro produkci bezvýznamná
Doba kultivace	20 týdnů nebo déle dle velikosti produktu

Odrůdy 'Juanita', 'Milky Way' a 'Florida Beauty' s listy nápadně slonovinově skvrnitými; robustnější 'Pennock' (D.x massefiana Bos) intermediární mezi rodičovskými druhy (D. surculosa x D. fragrans)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

Ostatní

VBN statistiky Po desetiletí patří k pěti nejprodávanějším hrnkovým rostlinám; VBN 2010 téměř 21.5 milionu prodaných rostlin s obratem 35.6 mil. eur.

Odkazy

- Bos J.J. (1984): Dracaena in west Africa. Agricultural University Wageningen Papers 84-1:1-126. -- Stahn B.& al. (1986): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutscher Landwirtschaft, Berlin.