

Taxon *Panicum virgatum* 'Strictum'

Název taxonu	<i>Panicum virgatum</i> 'Strictum'
Vědecký název taxonu	<i>Panicum virgatum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Strictum'
Český název	proso prutnaté
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Panicum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Neotropická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	jih Kanady, USA, Mexiko

Zařazení

Fytocenologický původ	původní druh prémie;
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	stébelnatá, krátce výběžkatá tráva; trs tvrdě vzpřímený, sloupovitý, v listu vysoký 130 - 150 cm, v květu 150 - 170 cm, široký 80 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla jemné, strmule vzpřímené, hustě olistěné, mnohačetné, zelené, na podzim slámově žluté
Listy	čárkovité, tmavě zelené, matné, dlouho zelené; od poloviny X listy i laty přecházejí do žlutooranžové, později slámově plavé
Květenství	laty řídké, do široka rozkladité, již od VIII načervenalé, poté hnědočervené
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Dlouhověkost	dlouhověká trvalka, s věkem nabývající na objemu
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší až od poloviny května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	ideální stanoviště je plné slunce, mírný polostín toleruje - je však slabší a trs může rozklesávat, málo vybarvuje
Faktor tepla	teplomilný taxon
Faktor vody	snáší široké rozpětí vlhkostních podmínek. Ideální je mírně a rovnoměrně vlhká půda. Velmi dobře snáší sucho. V sušších půdách rostliny dosahují menších rozměrů, ale lépe vybarvují a trsy se nerozklesávají
Faktor půdy	chudé, propustné, humózní
Faktor půdy - vápnostřežný	✓
Faktor půdy - poznámka	spíše mírně alkalické půdy

Užité vlastnosti

Období hlavního estetického...	od srpna do zimy - jemná textura, slámově žlutá barva na podzim a pohyb ve větru
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	solitéra, skupinové výsadby
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu
Růstové i jiné druhově spec..	trsy zůstávají dlouho prvně vzpřímené; na jaře seřezat celý trs na cca 10 cm
Doporučený spon pro výsad..	1 - 3 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením trsů brzy na jaře. Původní druh lze snadno množit semeny.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 1: záhon pod okny laboratoří / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D \(D3\)](#)
- [S 1: přední pravá lod'... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(S15\)](#)

- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada \(C2\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2010

Výsev/výsadba na stanoviš... výsadba od stejného dodavatele ve stejném roce na obou
stanovištích - podzim 2010

Dodavatel Zahrada Komořany

Grafické přílohy

