

Taxon Vitis vinifera Smederevski muskat

Název taxonu	Vitis vinifera Smederevski muskat
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Smederevski muskat´ (SM)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Smederevski muscat, Muscat Smederevskij
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o srbskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Muškát hamburgský´ x ´Zhilavka´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	muškátová stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, zašpičatělé
Listy	středně velké, tři až pětilaločné, silně vykrajované, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrásčitý, vespod štětinkovitě ochmýřený
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je velká, okrouhlá, zelenožlutá, při přezrávání hnědne
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA , do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci středně odolná k houbovým chorobám, citlivější k plísni šedé
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je chruplavá až rozplývavá, velmi dobré chuti s výrazným muškátovým aroma

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 127\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

