

Taxon Prunus armeniaca ‘Vynoslivyj’

Název taxonu	Prunus armeniaca ‘Vynoslivyj’
Vědecký název taxonu	Prunus armeniaca
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Vynoslivyj’
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	GNBS Jalta, Ukrajina
-------------------------------	----------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Peckovina
---------------------	-----------

Popisné a identifikační znaky

Květy	větší než ‘Velkopavlovická’, okrouhlé, blizna nad úrovní prašníků
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké (41 g), kvalita stejná jako u ‘Velkopavlovická’

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	1 až 2 dny po ‘Velkopavlovická’
-------------------------	---------------------------------

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	pozdní, 10 až 12 dnů po ‘Velkopavlovická’
-----------------------	---

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, zpracování
Plodnost	vysoká, pravidelná (i v nepříznivých podmínkách plodí stabilně)

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)