

Taxon Ajuga tenorii

Název taxonu	Ajuga tenorii
Vědecký název taxonu	Ajuga tenorii
Jména autorů, kteří taxon p...	C. Presl
Odrůda	‘Chocolate Chip’
Český název	zběhovec bezlodyžný
Synonyma (zahradnický pou..	Ajuga acaulis Brocchi
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Lamiaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	italský endemit - od Abruzz po Sicílii

Zařazení

Fytocenologický původ	horské skalnaté lesy, převážně na vápencích, mezi 1200-2200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Životní forma - poznámka	přechodné typy hemikryptofyt - chamaefyt (protohemikryptofyt)
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatě poduškovitá až kobercovitá trvalka, za květu do 0.1 m vysoká
Kořen	adventivní z plazivých oddenků
Výhony	hrnaté, sterilní stolony plazivé a ukončené rosetami, kvetoucí přímé, nevětvené, olysávající
Listy	elipčité lopatkovité v drobných přizemních růžicích, oddáleně tupě zubaté nebo celokrajné, roztroušeně chlupaté nebo téměř lysé
Květenství	klasnatě sblížené lichopřesleny chráněné kopinatými listeny
Květy	zygomorfní, různookalné, srostloplátéčné, pětičetné s redukovaným horním a tojlaločným spodním pyskem, modré, se čtyřmi tyčinkami
Opylovací poměry	Částečně samosprašná
Plody	elipčité tvrdky s elaiosomem
Semena	vysévány jsou celé plody

Možnost záměny taxonu (+..	chybně bývá nabízena jako <i>Ajuga reptans</i> L., zaměnitelná však snad jen s téměř nepěstovanými východoasijskými druhy (<i>Ajuga pygmaea</i> A.Gray s listy zvlně vykrajovanými a květy soliterními v terminálních axillách, <i>Ajuga decumbens</i> Thunb. s listy nepravidelně zubatými)
Dlouhověkost	relativně krátkověká, z nevhodných stanovišť rychle mizí
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -28°C až -36°C (USDA), pestrolisté odrůdy citlivější
Faktor vody	na vodu náročný mezofyt
Faktor půdy	propustná, ale vododržná, spíše neutrální (pH 5.8-7.2), nezasolená (EC do 1.0 mS.cm), humózní a výživná
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	přízpůsobivá, upřednostňuje karbonátové podklady

Užité vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a A - Alpinum
Choroby a škůdci	početné askomycety: <i>Sphaerotheca</i> , <i>Ramularia</i> , <i>Athelia</i> (<i>Sclerotium</i>), <i>Colletotrichum</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Corynespora</i> , <i>Myrothecium</i> , <i>Stemphylium</i> , <i>Botryotonia</i> , <i>Phytophthora</i> , <i>Pythium</i> , <i>Fusarium</i> ; ze škůdců svilušky (<i>Tetranychus</i>), mšice (<i>Myzus</i>), háďátka (<i>Meloidogyne</i> , <i>Pratylenchus</i>)
Doporučený spon pro výsad..	25-35 rostlin na m ²

Množení

Množení	Množení oddělků a „in vitro“ (mikropropagace)
Konečné hrnky	8-12 cm
Květní tvorba	neutrální k délce dne, nutná je nejspíš vernalizace - exaktní data dosud málo známa
Odrůdy	Několik málo odrůd lišících se vybarvením listů: zelenolistá 'Emerald Chip', bronzově purpurové 'Valfredda' ('Chocolate Chip')

- obchodní jméno) a 'Mauro', pestrolisté 'Vanilla Chip' a 'Toffee Chip'

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 9: záhon - svah podél budovy D na straně... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...

'Chocolate Chip' - X/2017

Dodavatel

'Chocolate Chip' - Botanické zahradnictví Holzbecherovi

Odkazy

- Colombo P, Lentini F. (2002): Morphology, anatomy and ecology of *Ajuga tenorii* (Lamiaceae). Quad. Bot. Ambient. Appl. 13: 93-98

Grafické přílohy

