

Taxon Vitis vinifera Rubinet

Název taxonu	Vitis vinifera Rubinet
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Rubinet´ (Ru)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Tintet, R-27
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´Revolta´ x ´Alibernet´) x ´André´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, tupé
Listy	malé, pětilaločnaté se středně hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, velmi slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; má středně velké kulaté bobule, modročerné barvy
Semena	menší, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Neronet´ (Ru má menší listy)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen

Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vyžaduje hlubší vododržné půdy
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová barvířková odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	mrazy netrpí, je citlivější na padlí révové
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno je intenzivní sytě červené barvy, s vyšším obsahem tříslovin, jemně kabinetové chuti
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 122\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

