

Taxon *Sedum acre*

Název taxonu	Sedum acre
Vědecký název taxonu	Sedum acre
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	rozchodník ostrý
Synonyma (zahradnický pou..	Sedum maweanum Hort.ex Praeg., Sedum krajinae Domin
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	subsp. neglectum
Nadřazená kategorie	Sedum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa a západní Asie (velkokvětá subsp. neglectum především v balkánských horách)

Zařazení

Fytocenologický původ	petrofyt, phellofyt, psammofyt - suchá skalnatá a kamenitá místa, písky, antropogenní stanoviště (navážky, náspy, zídky) - především v kolinním stupni do 900 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená
Životní forma	Chamaefyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka
Zařazení podle původu, nár...	skalky, suché zídky, extenzivní střešní zeleň

Popisné a identifikační znaky

Habitus	plazivě polštářovitá trvalka
Kořen	adventivní, nitkovitý
Výhony	sterilní plazivé, kořenující, hustěolistěné; kvetoucí vzpřímené, 0.1 m
Listy	silně dužnaté - vejčitě kuželovité, spirálně až šestiřadě střechovitě řazené, lysé, svěže zelené
Květenství	vidlanovitě větvené brakteát ní vijany
Květy	aktinomorfní - hvězdičkovité, pětičetné, žlutožluté, diplostemonické se žlutými prašníky
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	rozestálé bělavé měchýřky bez okrasné hodnoty

Semena	velmi drobná, elipčitá, červenohnědá
Možnost záměny taxonu (+..	extrémně variabilní a zaměnitelné s řadou příbuzných druhů - např. se středoevropským <i>S. sexangulare</i> L. a balkánským <i>Sedum urvillei</i> DC. (<i>S. sartorianum</i> Boiss.) - obě s listy téměř cylindrickými (u prvního z obou šestiřadými) a s menšími, zato početnějšími květy; nekvetoucí rostliny lze zaměnit s drobnějším a bělokvětým <i>Sedum anglicum</i> L.
Dlouhověkost	relativně dlouhověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	často od konce května

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	heliofyt
Faktor tepla	mrazuvzdorná do -40°C (USDA)
Faktor vody	xerofyt
Faktor půdy	propustná, pH 6.5-7.5
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	přízpůsobivý druh, upřednostňuje však půdy zásadité

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon), KSsk - Kamenitá stanoviště - mělký půdní profil na souvislé hornině, KSsš - Kamenitá stanoviště - skalní štěrbiny a A - Alpinum
Použití - pro trvalky - pozná..	Hensen & Groendijk-Wilders (1984): velmi dobré (‘Elegans’, ‘Yellow Queen’ a var. <i>krajinae</i>), ‘dobré’ (‘Aureum’ a var. <i>acre</i> - podobně i Sieber, 1989); postradatelné (‘Cristatum’)
Doporučený spon pro výsad..	24 - 36 rostlin na m2

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a Dělení trsů
Množení - poznámka	nejčastěji vrcholové řízky; také mechanický rozstřík segmentů (extenzivní střešní zeleň)
Konečné hrnky	6 - 8 cm
Retardace	ne

Květní tvorba	exaktní data nedostupná
Odrůdy	na půltuctu odrůd lišících se vzrůstností a zabarvením listů (´Aureum´, ´Yellow Queen´, ´Elegans´)

Ostatní

Odkazy

- Hensen K.J.W., Groendijk-Wilders N. (1984): An account of some Sedums cultivated in Europe. *Plantsman* 8 (1): 1-20;
- ´t Hart H. & Bleij B. (2003): Sedum. In: Eggli U., *Illustrated handbook of succulent plants, Crassulaceae*. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
- UHER, Jiří. 2012. Rozchodníky a netřesky. 6. Rozchodníky rodu *Oreosedum* s příbuznými rody. *Zahradnictví = Záhradníctvo*. Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 11(3), 34--37. ISSN 1213-7596.

Grafické přílohy



