

Taxon Crossandra infundibuliformis

Název taxonu	Crossandra infundibuliformis
Vědecký název taxonu	Crossandra infundibuliformis
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Nees (1832)
Český název	třepenitka nálevkovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Crossandra undulifolia Salisb., Crossandra axillaris Nees, Justicia infundibuliformis L., Ruellia infundibuliformis (L.) Andrews
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Crossandra

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast, Indická oblast a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	Pakistán, Indie, Srí Lanka, jihovýchodní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem a Listnatý keř stálezelený
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený, směstnaný polokeř až keř 30-50(-100) cm
Výhony	tenké, sytě zelené
Listy	vstřícné; čepel vejčitá, podlouhle kopinatá, 5-12 x 3-4 cm velká, zašpičatělá, celokrajná, hladká, lysá, tmavě zelená; okraj zvlněný
Květenství	dlouhé klasy šišticovitého tvaru, až 10 cm délky; vyrůstají z úžlabí listů
Květy	široce vějířovitě rozevřené, 5četné, asi 2 x 2,5 cm velké; barvy: oranžově žlutá až lososově růžová; řada odrůd s jednoduchými i plnými květy v různých odstínech výše zmíněných barev; podpůdné listeny zelené a ochlupené
Možnost záměny taxonu (+..	Crossandra nilotica Oliv. - listy jsou měkce pýřité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	přes léto polostín, v zimě světlé bez přímého slunce
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplý skleník či interiér; v létě teplota 18-20 °C; v zimě 13-16 °C
Faktor vody	neustále vlhký kořenový bal; vysoká vzdušná vlhkost; časté rosení i zálivka měkkou vodou o pokojové teplotě; v případě období klidu zálivka omezená
Faktor půdy	humózní substrát s trochou zahradní zeminy; pH 5,0 až 6,0

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	únor až říjen
Použití	okenní vitríny, skleníky, sesazované nádoby, kvetoucí doplněk výsadeb ve sklenících a zimních zahradách; krátkodobá kvetoucí hrmkovka pro doplnění otevřených interiérů
Choroby a škůdci	svilušky, molice a listové mšice; svinování listů v příliš suchém vzduchu

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Vrcholové řízky
Množení - poznámka	řízkování při teplotách 20-25 °C

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici • S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	• http://www.tropicos.org/Name/100032?tab=references • http://www.biolib.cz/cz/taxon/id192860/
--------	--

Grafické přílohy

