

Taxon Cornus stolonifera

Název taxonu	Cornus stolonifera
Vědecký název taxonu	Cornus stolonifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Michx.
Český název	svída výběžkatá
Synonyma (zahradnický pou..	Cornus sericea, Swida stolonifera
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cornus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA) a Severoamerická atlantická oblast (východ SA)
------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2 - 3 m, šířka 2 - 3 m, poměrně nízké, výběžkaté a poléhavě se rozrůstající keře
Výhony	letorosty svěže zelené až nažloutlé
Pupeny	protistojné
Listy	listy (oválně) kopinaté až eliptické nebo vejčité, špičaté až pozvolna zašpičaté, 5–10(–14) cm dlouhé, svrchu živě nebo tmavě zelené, rub namodralý až bělavý, lysé nebo naspodu přitiskle chlupaté, 5–6 párů žilek, při opadu svrchu červenavé a naspodu bělavě šedé, řapíky 10–25 mm dlouhé
Květenství	v krátkce stopkatých vrcholících na koncích letorostů, 3 - 8 cm široké, stopky květenství přitiskle chlupaté
Květy	květy žlutobílé až slonovinově bílé
Plody	peckovice, špinavě bílé až namodralé, obvykle podlouhlé, až 8 mm v průměru
Semena	pecka - pecky tak dlouhé jako široké, hnědavě černé
Kůra a borka	napurpurově červená, v zimě zářivě červená

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
----------------------	--------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilná
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 3 (do - 40°C)
Faktor vody	na vlhkost půdy nenáročný, ale svědčí mu vlhší půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	průklest od zimy do jara - záleží-li v zimě na vynikání barvy letorostů
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona - barevné olistění, v zimním období - červené zabarvení kůry výhonů
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky a Hřížení
Množení - poznámka	nejčastějšími způsoby množení jsou: letními nebo zimními řízky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice)
--------------------------	--

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)