

Taxon Vitis vinifera Muskat zlutý

Název taxonu	Vitis vinifera Muskat zlutý
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Muškát žlutý’ (MŽ)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Muscat lunel, Gelber Muscateller, Muscat blanc, Muscat de Frontignan
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda jejíž původ ani křížení není přesně známo, skupina muškátů patří k nejstarším odrůdám révy vinné a jejich pravlastí je pravděpodobně Sýrie a Egypt

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle červenohnědé, někdy hůře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, tři až pětilaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, většinou uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý, vespod se štětinami na žilnatině
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, válcovitě-kuželovitý, středně hustý až hustý hrozen; bobule je středně velká, kulatá, žlutozelená, na osluněné straně zlatavě žlutá s hnědými skvrnami
Semena	středně velká, elipsovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až dobrá
Faktor vody	nevhodné jsou těžké půdy a půdy s vyšším obsahem vápníku
Faktor půdy	záhřevné a úrodnější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažen
Podnož	Kober 125 AA, CR 2, SO 4, dle půd a vedení

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivější k houbovým chorobám, napadána hmyzem i obaleči
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-13 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	vůně vína muškátová; stejně tak i chuť s buketem citrusových plodů a včelího vosku
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, cuvée

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 113)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

