

Taxon Swida alba ‘Spaethii’

Název taxonu	Swida alba ‘Spaethii’
Vědecký název taxonu	Swida alba
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Opiz in Bercht. & Opiz
Odrůda	‘Spaethii’
Český název	svída bílá
Synonyma (zahradnický pou..	Swida alba f. spaethii
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Cornaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru:

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 2 - 2,5 m, šířka 1,5 - 2 m, vzrůst slabší, stěsnaný, vzpřímený výhony strmule vzpřímené, se stářím klenuté, ne však plazivé, bez výběžků
Výhony	letorosty zprvu pýřité, posléze lysé a voskovitě ojiněné, mají bílé nebo šedé lenticely, kůra je napurpurověle červená
Pupeny	protistojné
Listy	listy (vejčitě) eliptické až (široce) vejčité, (2-)4-10 cm dlouhé, na vrcholku špičaté či zašpičatělé, báze klínovitá nebo široce klínovitá, listy při rašení bronzově žluté, později široce zlatožlutě lemované a zčásti i celé žluté, střed listů je zelený nebo zelenočervený, rub namodralý, 5-7 párů žilek, řapíky (2-)7-25 mm
Květenství	v krátce stopkatých vrcholcích na koncích letorostů, 3 - 8 cm široké, stopky květenství přitiskle chlupaté
Květy	květy žlutobílé či krémově bílé, 3-9 mm v průměru
Plody	peckovice, špinavě bílé až světle modré, obvykle podlouhlé, až 8 mm v průměru
Semena	pecka - elipsoidní až téměř kosočtverečná
Kůra a borka	napurpurověle červená, v zimě zářivě červená

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlomilná
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	více vyhovuje polostín - slunce - popálení listů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, Zóna 3 (do - 40°C)
Faktor vody	snáší nižší i vyšší půdní vlhkost, ne zamokřené půdy
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně vápenité, suché až živné půdy
Faktor půdy - poznámka	Po zakořenění snáší i sucho a horší zem

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	průklest od zimy do jara - záleží-li v zimě na vynikání barvy letorostů
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona - barevné olistění, v zimním období - červené zabarvení kůry výhonů
Použití	okrasný keř - skupiny, soliterní

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky, Bazální řízky a Hřížení
Množení - poznámka	nejčastějšími způsoby množení jsou: letními nebo zimními řízky

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendelem (Matečnice)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 15 cm nad zemí)