

Taxon Vitis vinifera Ryzlink buketovy

Název taxonu	Vitis vinifera Ryzlink buketovy
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Ryzlink buketový’ (RBuket)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Bouquet riesling, Bouquetriesling blanc
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patně francouzská odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Ryzlink rýnský’ a ‘Muscat précoce de Courtillier’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, žlutavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	menší až středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, okrouhlé, jemně tří až pětilaločnaté, bazální výkroj je lyrovitý, úzce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, válcovitě-kuželovitý hrozen, často s křídélkem, středně hustý; bobule je malá až střední, kulatá, žlutozelené barvy, s černou tečkou po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody	vlhké, jílovité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	lépe lehčí půdy, písčité i kamenité
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož	na suchých půdách Kober 5 BB i Kober 125 AA, na vlhčích pak CR 2 a S0 4

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	odolnost k houbovým chorobám je střední, nízká k plísni šedé, sprchává
Plodnost	pozdní, nižší ale pravidelná (výnos 4,5-8 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má odrůdovou jemně kořenitou vůni i chuť, nedosahuje však kvalit Ryzlinku rýnského
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 132)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

