

Taxon lactuca sativa var crispa

Název taxonu	lactuca sativa var crispa
Vědecký název taxonu	Lactuca sativa
Jména autorů, kteří taxon p...	L. L.
Odrůda	typ lollo- vyznačuje se kadeřavými listy žlutozele
Český název	Salát listový
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. capitata
Nadřazená kategorie	Lactuca

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Itálie
-------------------------------	--------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro listovou růžici

Popisné a identifikační znaky

Habitus	listová růžice
Kořen	plytká kořenová soustava, křivý kořen krátký
Listy	celokrajné nebo stříhané, žluté, zelené, červené nebo červeno hnědé barvy
Květenství	za dlouhého dne prorůstá 0,8 - 1 m dlouhá dužnatá lodyha, nesoucí vrcholičnaté květenství, kvetení podporuje i vysoká teplota a sucho
Květy	žluté květy sestavené v úbor
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	ochmýřená nažka
Semena	podle odrůdy stříbřité nebo hnědé barvy, HTS 0,8 - 1,2 g
Vytrvalost	jednoleté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete za dlouhého dne
-------------------------	-----------------------

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Říjen

Doba zrání - poznámka dle termínu výsadby

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor tepla nenáročný, roste již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí

Faktor půdy středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

Užitné vlastnosti

Použití zelenina

Choroby a škůdci okrajová nekróza listů, zasolení (salinita) půdy, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), bakteriální vadnutí salátu (bakterie *Pseudomonas marginalis* pv. *marginalis*), podehnívání salátu (různé houby např. *Sclerotinia sclerotiorum*, *S. minor*, *Botryotinia fuckeliana*, *Rhizoctonia solani*, plíseň salátu (*Bremia lactucae*), mšice (Aphidoidea), drátovec (Elatidae)

Doporučený spon pro výsad.. typ lollo 0,25 - 0,3 x 0,2 - 0,25 m, typ dubolistý 0,3 x 0,25 - 0,3 m, pro opakovanou sklizeň 0,2 - 0,3 x 0,05 - 0,08 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Množení - poznámka málo z přímého výsevu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)