

Taxon Acer tataricum ssp ginnala

Název taxonu	Acer tataricum ssp ginnala
Vědecký název taxonu	Acer tataricum ssp. ginnala
Jména autorů, kteří taxon p...	(Maxim.) Maxim.
Český název	javor ginnala
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Poddruh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	pobřežní křoviny a horské doliny

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	široký, někdy až stromkovitý keř s několika kmínky, výška 3-10 m, koruna nad zemí rozložitá
Výhony	mladé výhony jsou lysé, sivozelené nebo červenavé, později hnědé
Pupeny	šupiny pupenů na bázi červenavé, jinak černé
Listy	3laločné, 4-10 cm dlouhé, 3-6 cm široké, střední lalok mnohem delší než postranní, ostře a krubě 2x pilovité, líc tmovozelený, lesklý, lysý, rub světle zelený, lysý, řapík 1-5 cm
Květenství	vzpřímené laty
Květy	žlutobílé, vonné
Plody	nažky asi 2,5 cm dlouhé, s křídly téměř rovnoběžnými nebo až v ostrém úhlu rozevřenými
Kůra a borka	borka je tenká, temně šedohnědá, hladká a na povrchu rozpraskaná u starých rostlin
Možnost záměny taxonu (+..	Acer tataricum (matné, nemá laločnaté listy)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu po olistění
-------------------------	----------------------------

Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilný, ale snese i přístínění
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, oblasti I-III
Faktor vody	daří se mu lépe ve vlhkých humózních půdách ale roste i na sušších stanovištích
Faktor půdy	preferuje humózní půdy, hlinité, propustné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	při rašení a na podzim se listy barví do červena
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin) a VPz - Volné plochy záhonového charakteru
Použití	celkem nenáročná dřevina, která je poměrně často vysazována do veřejné zeleně či do zahrad, do skupin, solitéra
Choroby a škůdci	obvykle netrpí škůdci
Růstové i jiné druhově spec..	snáší exhalace, velmi dobře snáší řez

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka	očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy	Acer ginnala 'Aureo-variegatum', listy žlutopestré, Acer ginnala 'Red Wings', plody červené, zbarvují se již v květnu, velmi hezké, Acer ginnala 'Summer Splendor', plody jasně červené, hezké