

Taxon Scabiosa caucasica

Název taxonu	Scabiosa caucasica
Vědecký název taxonu	Scabiosa caucasica
Jména autorů, kteří taxon p...	Marschall von Bieberstein
Český název	hlaváč kavkazský
Synonyma (zahradnický pou..	dnes platné jméno Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet, zahradnický zatím nezaužívané
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Lomelosia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Kaukaz, severní Irán, sv. Turecko

Zařazení

Fytocenologický původ	subalpínské louky, slunné skalnaté a travnaté svahy v nadmořských výškách 1900-2900 m n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá bylina, 50-70 (80 cm) vysoká
Výhony	vzpřímené, chudě vidličnatě větvené, pod květenstvím neolistěné, řídce chloupkaté - olisalé
Listy	variabilní, přizemní a dolní lodyžní listy jsou jednoduché, celokrajné, kopinaté, vstříčné, horní lodyžní listy jsou na bázi srostlé, někdy peřenosečné, úkrojky čárkovité, mírně našedlé
Květenství	strboul, vnější obvodové květy zvětšené, zvlněné, 4 - 6 cm velké, okraj okvětního plátku vroubkovaný, barva modrá nebo bílá
Plody	drobné nažky, eliptické, tetragonální, s osmi žebry a pěti štětinami
Vytrvalost	mrazuvzdorná do cca -30 °C
Dlouhověkost	krátkověká - potřebuje časté obnovování ve výsadbách (cca po 3 letech)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování - poznámka	slabě může zaremontovat

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	plné slunce
Faktor tepla	teplé polohy
Faktor vody	přiměřeně vlhké, ve velkém suchu trpí padlím; v zimě v příliš vlhkých půdách může vyhnívat
Faktor půdy	lehké, živné, propustné, vápenaté půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	především záhony a k řezu (komerční obchodování na květinové burze)
Choroby a škůdci	trpí padlím
Růstové i jiné druhově spec..	vizuálně atraktivní trvalka v květu ale i po odkvetení (plodenství), dlouhá trvanlivost ve váze krátkověkost, časté přesazování a přemnožování
Doporučený spon pro výsad..	9-12 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Řízkování
Množení - poznámka	semenem, řízkováním a dělením trsů
Odrůdy	řada odrůd kvetoucích bíle ('Alba', 'Bressingham White', 'Loddon White', 'Miss Wilmot'), modře ('Perfecta', 'Stäfa', 'Blue Perfection', 'Claire Greaves' - levandulově modré květy, 'Clive Greaves' 'Compliment' 'Fama') a jiné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... O 15: 'Alba', 'Perfecta' X/2014

Grafické přílohy



