

Taxon Cornus alba

Název taxonu	Cornus alba
Vědecký název taxonu	Cornus alba
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	svída bílá
Synonyma (zahradnický pou..	Swida alba (L.) Opiz
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Sibiř až Mandžusko a severní Korea

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř 1,5-3 m vysoký, výhony stnule vzpřímené, věkem poněkud klenuté, nikoliv plazivé
Výhony	výhony červené, mladé zprvu pýřité, posléze lysé a voskovitě ojíněné, mají bílé nebo šedé lenticely
Pupeny	vstřícné
Listy	listy eliptické až vejčité, 4–10 cm dlouhé, na vrcholku špičaté či zašpičatělé, báze klínovitá nebo široce klínovitá, živě zelené, rub namodralý, při opadu jsou červenavě purpurové, 5–7 párů žilek, řapíky 7–25 mm
Květenství	květenství je 3–8 cm široké, stopky má 2–4 cm dlouhé a přitiskle chlupaté
Květy	květy žlutobílé či krémově bílé, 3–9 mm v průměru
Plody	plody špinavě bílé až světle modré, obvykle podlouhlé, až 8 mm v průměru
Kůra a borka	kůra napurpurověle červená, v zimě až zářivě červená

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	velmi otužilý druh
Faktor vody	nenáročná
Faktor půdy	nenáročná

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	řez snáší dobře, lze tvarovat
-----	-------------------------------

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VI - květ, zima - efekt barvy výhonů
Použití	podrost, tvarování, živé ploty, efekt zimního dřeva, násypy silnic, meliorační dřevina

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky a Očkování
Množení - poznámka	nejčastěji množení letními či zimními řízky, popř. semeny, lze též očkovat na druhy příbuzné
Odrůdy	Argenteomarginata' - velký keř, 180–240 cm výška, kmínky v zimě tmavočervené, v létě spíše zelenočervené, 'Sibirica' - má slabší vzrůst, výhony světlivě červené až tmavě korálově červené, 'Sibirica Variegata' - široké, vzpřímené keře vysoké 2–3 m, podobné 'Sibirica', list bíle nepravidelně lemovaný, 'Spaethii' - vzrůst slabší, stěsnaný, vzpřímený; listy při rašení bronzově žluté, později široce zlatožlutě lemovaný