

Taxon Vitis vinifera Dornfelder

Název taxonu	Vitis vinifera Dornfelder
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Dornfelder´ (Dr)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	We S-341
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o německou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Helfensteiner´ x ´Heroldrebe´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je silné, šedohnědé, vyzrává dobře
Pupeny	středně velké až velké, tupé
Listy	středně velké až velké, výrazně pětilaločnaté, se středně hlubokými výkroji; bazální výkroj je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je tmavě zelený, vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, křídlatý, středně hustý hrozen; bobule je středně velká až velká, elipsovitá, modročerné barvy
Semena	velká, hruškovitá, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou sušší a kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na úrodných půdách SO 4 a Teleki 5 C, na sušších půdách CR 2 či Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám
Plodnost	střední pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je tmavě červené s vůní lesních plodů, brusinek až zelené papriky
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 92)
--------------------------	--

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

