

Taxon Malus domestica ‘Ontario’

Název taxonu	Malus domestica ‘Ontario’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Ontario’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	‘Ontarioapfel’
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Kanada, Ontario, Paris, Ch. Arnold, 1820
-------------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	kříženec ‘Wagenerovo’ x ‘Northern Spy’
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna kulovitá, zahuštěná dlouhými výhony
Pupeny	listoové pupeny jsou středně velké, široce kuželovité, oble zašpičatělé, silně šedé, plstnaté, mírně odstávají až přiléhají, květní pupeny bývají dlouhé, velké, pokryté šedou plstí s krycími červenohnědými šupinkami
Listy	středně velké až větší, široce eliptické, s poněkud tupější špičkou, až kopinaté, jedna strana bývá více vyvinutá, tmavě zelené, pololesklé, na rubu ochmýřené
Květy	středně velké až větší, miskovité, korunní plátky ohnuté, značně zkadeřené, se zvlněným okrajem, bílé, se zelenavým nádechem
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velké (220-230 g), ploše kulovité s žebry, světle zelené s červeným líčkem, nakyslé, středně šťavnaté a aromatické, rychle hnědne, kvalitní a chruplavé s vyšším obsahem vitamínu C; dobrý opylovač, vhodní opylovači jsou odrůdy ‘Coxova reneta’, ‘James Grieve’, ‘Jonathan’, ‘Matčino’, ‘Oldenburgovo’, ‘Průsvitné letní’, ‘Wealthy’, ‘Zvonkové’
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, typické listy a květy, tvar a vybarvení plodů.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně pozdní, průměrně od 10. do 20. května
-------------------------	---

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	polovina října (skladování do března), pozdně zimní odrůda
-----------------------	--

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vhodná do středních a teplých oblastí
Faktor půdy	polopropustné, zahřevné půdy s dostatkem živin a vláh

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	méně jako čtvrtkemn, hlavně jako volný a větvenovitý zákrsek
Řez	dobře snáší střední až hluboký řez
Podnož	vhodné M 1, M 11, A 2, MM 106, M 4, M 7, M 9, J-TE-E, J-TE-H

Užitné vlastnosti

Použití	konzum, konzervace, nevhodná k transportu
Choroby a škůdci	středně odolná proti houbovým chorobám
Růstové i jiné druhově spec..	růst středně bujný, později slabý
Plodnost	střední pravidelná, 10-14 t/ha

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad (Výsadba jabloní)
--------------------------	--

Ostatní

Poznámka	Pro své některé specifické vlastnosti je tato odrůda stále pěstována na zahrádkách. Ve velkovýrobě ji již dříve vytlačila odrůda 'Idared' a nyní i odrůda 'Gloster'.
----------	--

Grafické přílohy

