

# Taxon Corylus avellana

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Corylus avellana                        |
| Vědecký název taxonu           | Corylus avellana                        |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                      |
| Český název                    | líška obecná                            |
| Autor                          | Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                    |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Corylus</a>                 |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Evropa, severní Afrika, Malá Asie, Kavkaz Sýrie                               |

## Zařazení

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý |
| Životní forma       | Fanerofyt                                     |

## Popisné a identifikační znaky

|              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus      | opadavý rozložitý, vícekmenný keř nebo menší strom, výška 1-5 m                                                                                                                          |
| Výhony       | letorosty žláznatě pýřité, načervenalé žláznaté chlupy odstávají od větévek                                                                                                              |
| Pupeny       | střídavé                                                                                                                                                                                 |
| Listy        | okrouhlé až široce vejčité nebo široce eliptické, 5-12 cm velké, báze srdčitá, 2x pilovité a nepravidelně slabě laločnaté, řapík 5-15 mm, žláznatě štětinatě chlupatý                    |
| Květenství   | samčí jehnědy obvykle po 2-4, jsou 3-8 cm dlouhé, samičí květenství nenápadná, umístěná v hnědém, přisedlém, pupenovitém obalu, z něhož vyčnívají pouze červené až červenofialové blizny |
| Plody        | plody po 1-5, vejčité, zpočátku žlutozelené, později hnědé, až 20 mm, listenový obal zpravidla kratší než oříšek                                                                         |
| Semena       | jedlá                                                                                                                                                                                    |
| Dlouhověkost | krátkověká dřevina                                                                                                                                                                       |

## Doba kvetení

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Začátek doby kvetení | Únor  |
| Konec doby kvetení   | Duben |

## Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Srpen |
| Konec doby zrání   | Září  |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                               |
| Faktor světla - polostín | ✓                               |
| Faktor tepla             | oblas I, II, III (IV)           |
| Faktor vody              | upřednostňují vlhké půdy        |
| Faktor půdy              | hlinité půdy a dostatkem humusu |

## Užitné vlastnosti

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Období hlavního estetického... | II-IV - květenství, dále listy                                                                        |
| Použití                        | větší krajinářské úpravy nebo jako podrost vyšších dřevin, jednotlivě či ve skupinách, ovocná dřevina |
| Choroby a škůdci               | dlouhonosci                                                                                           |

## Množení

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení            | Předpěstování sadby, Hřížení a Roubování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Množení - poznámka | množíme buď výsevem nebo hřížením (původní druh i kultivary), pokud chceme dosáhnout stromkovitého tvaru kultivaru, nebo chceme, aby neodnožoval, roubujeme                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odrůdy             | Aurea' - vzrůst slabší, výhony v zimě oranžové; listy žluté a později zelenožluté, 'Contorta' - hustý keř až 4 m vysoký, velmi staré rostliny až 6 m vysoké, s pokroucenými větvkami, roste pomalu, 'Fuscorubra' - listy na jaře tmavě červené, později červenohnědé až červenozelené, 'Heterophylla' - stříhané listy, 'Pendula' - keřovitý stromek s převisajícími větvkami, koruna sahá často k zemi |