

Taxon *Deschampsia cespitosa* 'Goldtau'

Název taxonu	<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldtau'
Vědecký název taxonu	<i>Deschampsia cespitosa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) P. Beauv
Odrůda	'Goldtau'
Český název	metlice trsnatá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Aira cespitosa</i> L.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Deschampsia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	odrůda Bs - Bornim

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste na velmi variabilních stanovištích - ve vlhkých lesích a na jeho světlyých okrajích, na suchých i mokřích loukách, pastvinách, v příkopech, často na sněhových výležiscích, na naplaveninách kolem vodních toků
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená a Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktní trsnatá odrůda
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	velmi jemné, ale pevné mnohačetné stébla
Listy	tmavě zelené, široké pouze kolem 0,5 cm, drsně rýhované. V listu vysoká 30 - 40 cm
Květenství	velmi jemné vzdušné laty 10 - 50 cm dlouhé, stříbřitě zelené, koncem léta barvící do slámově žluté barvy, na stéblech cca 80 cm dlouhých
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Dlouhověkost	spolehlivá, dlouhověká trvalka
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka	raší koncem března svěže zelenými listy

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	barevná promenlivost taxonu spojená s kvetením

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	tráva s velmi širokou amplitudou světelných podmínek na stanovištích
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké i suché půdy
Faktor půdy	propustná, živná, hluboká, hlinitá půda i těžší půda
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné ph, roste jak na kyselých tak na zásaditých půdách

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od června do jara dalšího roku, vzácná pro velmi jemnou texturu
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	široké možnosti uplatnění. Po odkvětu vysemeňuje, v intenzivně ošetřovaných záhonech je vhodné květenství po odkvětu seřezat.
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu - květenství se nerozpadává
Choroby a škůdci	občas bývá napadena rzí travní
Růstové i jiné druhově spec..	velmi jemná textura, pohyb stébel ve větru, barevná proměnlivost taxonu v průběhu roka,
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m ²

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	pokud se odrůda množí semeny, ztrácí odrůdové vlastnosti

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěnky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A \(Záhon A2\)](#)
- [C 1: záhon vpravo od hlavního vchodu / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)
- [R: pozemky bývalého učiliště / ZF - R - Rozvojová plocha](#)