

Taxon *Prunus armeniaca* 'Velkopavlovická'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Velkopavlovická'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Velkopavlovická LE-12/2'
Český název	meruňka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Pawlowitzer Marille, Löwörská, Žlutomasá, Wurtemberská, Broskvová, Bohutická
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Česká republika, Podivín
-------------------------------	--------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	klon 'Hungarian Best'
Pěstitelská skupina	Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Listy	velké, kulovitě až srdcovitě protáhlé, ušlechtilého vzhledu, matné
Květy	středně velké, bílé, okrouhlé, blizna nad úrovní prašníků, průměrně na 1 pestík 28-32 tyčinek
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké, kulovitě oválné, tmavě oranžové, dužnina středně pevná, rozplývavá, sytě oranžová, dobrá odlučitelnost, velmi chutná, jádro sladké

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	středně raná (na jižní Moravě je dlouhodobý průměr 16.-17. 4.), trvá 6,5 dne
-------------------------	--

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	konec července - začátek srpna
-----------------------	--------------------------------

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	vysoce odolná proti mrazu ve dřevě, květní pupeny velmi citlivé na
--------------	--

	výkyvy teplot v předjaří
Faktor vody	nesnáší těžké uléhavé půdy s vysokou hladinou podzemní vody
Faktor půdy	daří se na písčitohlinitých až hlinitopísčitých půdách s neutrální reakcí

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	čtvrtkmen s volně rostoucí, řídké patrovitou korunou, zákrsek, špičák s předčasným obrostem
Řez	nesnáší přísné tvarování
Podnož	M-VA-1 až M-VA-4, M-LE-1

Užitné vlastnosti

Použití	konzervárenství, přímý konzum
Choroby a škůdci	relativně odolná proti minilíže, značně citlivá k Gnomonia erythrostoma a virové šarce švestek (PPV)
Růstové i jiné druhově spec..	zpočátku silně, později středně vzrůstná odrůda, růst je dravý
Plodnost	vysoká, pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladíma / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Grafické přílohy

