

Taxon *Veronica spicata*

Název taxonu	Veronica spicata
Vědecký název taxonu	Veronica spicata
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	‘Heidekind’
Český název	rozrazil klasnatý
Synonyma (zahradnický pou..	Syn. Pseudolysimachion spicatum
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Pseudolysimachion

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Eurasijský druh, na území ČR domácí

Zařazení

Fytocenologický původ	Roste na výslunných stepních loukách a stráních, na skalnatých svazích, na okrajích doubrav a borů, a to v pásmu od nížin po pahorkatiny
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina 10 – 50 cm
Výhony	lodyha již od báze huste chlupatá, v horní části vetvené
Listy	list mírně našedlý, , 6–10 x 2–3 cm velký, vstříčný, úzce podlouhle kopinatý (tvarem připomíná list broskve) se široce klínovitou bází přecházející u spodních listů v krátký řapík. Horní listy až přisedlé, směrem ke květenství na lodyze řidnou a zmenšují se. Okraj čepele zřetelně ostře pilovaný.
Květenství	květy jsou uspořádány do štíhlého, hustého, kuželovitého vrcholového klasu s délkou (5)15–20 cm
Květy	Květy krátce řapíkaté, kalich stříhaný na 4 segmenty 2–3 mm dlouhé. Koruna 4-četná, nezřetelně dvoupyská, tmavě nebo světle modrofialová.
Plody	tobolka
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná

Dlouhověkost	středně dlouhověká
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	preferuje teplé a slunné polohy
Faktor vody	suché
Faktor půdy	suché

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), A - Alpinum a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	skalky, zídky, záhony, světlé a suché okraje DVP, pbvp

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Odrůdy	liší se a) barvou květu: F-M (´Azzurro´, ´Twilight´, ´Purplecious´) Rů v různých odstínech (´Icicle´, ´Rosa Ywerg´, Č (´Erica´, ´Rotfuchs´) aj.; b) výškou – většina volně rostoucích odrůd vysoká 30–40 cm. Kompaktní odrůdy (např. ´Nana Blautepich´–15 cm) V pěstování také řada hybridních odrůd vzniklých hybridizací V.spicata s V. marimita (Veronica x media) nebo s V. longifolia a označované pouze odrůdovými jmény. Významným šlechtitelem nových, moderních odrůd je nizozemec Wilhelmus T. J. van den Hoogen – např. série First v 5 barvách, která nepřekročí 30 cm a je vhodná pro hrnkovou kulturu nebo série ´Clea´, ´Caya´, ´Smart´ v několika barvách (60 cm) pěstované k řezu.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 15: suchá zídka podél skleníku / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Grafické přílohy

