

Taxon Pennisetum villosum

Název taxonu	Pennisetum villosum
Vědecký název taxonu	Pennisetum villosum
Jména autorů, kteří taxon p...	R. Br. ex Fresen.
Český název	dochan huňatý
Synonyma (zahradnický pou..	Pennisetum longistylum hort. Vilm. non Hochst ex A. Rich.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Poaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Saharsko-arabská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Etiopie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička nepravá
Pěstitelská skupina - pozná..	v domovině vytrvalý druh, u nás nepřezimuje
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá tráva, v listu vysoká 30 - 40 cm, v květu 60 - 70 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla mnohačetná jemná, 60 - 70 cm dlouhá
Listy	šedo zelené, na okraji drsné, 0,5 - 1 cm široké a 50 cm dlouhé
Květenství	hustě osinaté, mírně obloukovitě ohnuté lichoklasy, přibližně 3 cm široké a 10 cm dlouhé. Osiny nápadně dlouhé. Barva květenství zpočátku světle zelená, později stříbřitá.
Květy	lichoklas s dlouhými osinami
Plody	obilka
Vytrvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
------------------------	---

Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon vyžadující předpěstování
Faktor vody	zahradní půda s občasnou zálivkou
Faktor půdy	živné, propustné půdy. V těžkých hlinitých, zamokřených půdách a v chladném létě neprospívá - slabě kvete nebo nemusí vůbec zakvést

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	velmi dekorativní od srpna do konce vegetačního období
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití	Soliterní nebo skupinová výsadba v letničkových záhonech, ve společenstvech s kamenem; řez; sušení - nutno sklízet na počátku metání. Lichklasy se i tak mohou rozpadat.
Růstové i jiné druhově spec..	Velmi elegantní tráva jemné textury a atraktivního květenství.
Doporučený spon pro výsad..	5ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ze semen v dubnu. K výsevu lze použít část klásků nebo špetky semen do sadbovačů. Výsadba na záhon v druhé polovině května.

Grafické přílohy

