

Taxon *Deschampsia cespitosa* Goldschleier

Název taxonu	<i>Deschampsia cespitosa</i> 'Goldschleier'
Vědecký název taxonu	<i>Deschampsia cespitosa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) P. Beauv
Odrůda	'Goldschleier'
Český název	metlice trsnatá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Aira cespitosa</i> L.
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Poaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast
Biogeografické regiony - po..	odrůda od Pagels

Zařazení

Fytocenologický původ	základný druh roste na velmi variabilních stanovištích - ve vlhkých lesích a na jeho světлых okrajích, na suchých i mokřých loukách, pastvinách, v příkopech, často na sněhových výležiscích, na naplaveninách kolem vodních toků
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálezelená a Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kompaktní, trsnatá tráva v listu 40 cm vysoká, v květu obvykle 80 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	velmi jemné, ale pevné mnohačetné stébla 80 cm dlouhé
Listy	tmavě zelené, široké pouze kolem 0,5 cm, drsně rýhované.
Květenství	velmi jemné vzdušné laty asi 30 cm dlouhé, zprvu svěže zelené, poté tmavě zlato hnědé
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Dlouhověkost	spolehlivá, dlouhověká trvalka
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)
Doba rašení - poznámka	raší koncem března svěže zelenými listy

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen
Doba kvetení - poznámka	barevná proměnlivost taxonu spojená s kvetením

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	tráva s velmi širokou amplitudou světelných podmínek na stanovištích
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná
Faktor vody	vlhké i suché půdy
Faktor půdy	propustná, živná, hluboká, hlinitá půda i těžší půda
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné pH, roste jak na kyselých tak na zásaditých půdách

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od června do jara dalšího roku, vzácná pro velmi jemnou texturu
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	široké možnosti uplatnění. Po odkvětu vysemeňuje, v intenzivně ošetřovaných záhonech je vhodné květenství po odkvětu seřezat.
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu - květenství se nerozpadává
Choroby a škůdci	občas bývá napadena rzí travní
Růstové i jiné druhově spec..	velmi jemná textura, pohyb stébel ve větru, barevná proměnlivost taxonu v průběhu roka,
Doporučený spon pro výsad..	5 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	pokud se odrůdy množí semeny, ztrácejí odrůdové vlastnosti

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěnky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A](#)
- [C 1: záhon vpravo od hlavního vchodu / ZF - C - Výsadby v okolí budovy C](#)
- [R: pozemky bývalého učiliště / ZF - R - Rozvojová plocha](#)
- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada \(záhon Z11 - 'Goldschleier'\)](#)