

Taxon Lonicera japonica

Název taxonu	Lonicera japonica
Vědecký název taxonu	Lonicera japonica
Jména autorů, kteří taxon p...	Thunb. ex Murray
Český název	zimolez (kozí list) japonský
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Japonsko, Čína, Korea

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	poloopadavý až stálezelený ovíjivý keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	poloopadavý až stálezelený ovíjivý keř, délka 3-10 m
Výhony	výhony v mládí pýřité
Pupeny	vstřícné
Listy	listy vejčité eliptické, vejčité až podlouhlé, 3-8 cm, zprvu oboustranně chlupaté, později svrchu lysé, řapíky 5 mm
Květy	květy dvoupyské, 3-4 cm, bělavě růžové nebo bělavě žluté s purpurovým nádechem, dlouze trubkovité, po 2 v paždí listů (vyjímka v popínavkách), silně vonné
Plody	plody (modře) černé, až 7 mm v průměru, bobule, po dvou na stopečce

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilá
Faktor tepla	oblast I-II (III- pouze jako pokrývná rostlina), teplomilná
Faktor vody	střední vlhko

Faktor půdy na půdu nenáročná

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení pokud ji nechceme jako pokryvnou, vysazujeme ke konstrukci

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... VI-IX - květ

Použití popínavá a pokryvná dřevina

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky a Hřížení
Množení - poznámka	semenem se množí čistý druh na izolovaných, popřípadě endemických, původních stanovištích, nejčastější způsob množení je řízkování pomocí dřevitých řízků, můžeme i hřížit
Odrůdy	‘Aureoreticulata’ - žlutopestře panašovaný list, barví červeně

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 7: záhon před hlavním vchodem do budovy... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)