

Taxon *Hepatica nobilis*

Název taxonu	Hepatica nobilis
Vědecký název taxonu	Hepatica nobilis
Jména autorů, kteří taxon p...	Mill.
Český název	jaterník podléška
Synonyma (zahradnický pou..	Anemone hepatica L., Hepatica triloba Gilib.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ranunculaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	střední Evropa, Středozeří, Balkán, evropská část Ruska

Zařazení

Fytocenologický původ	prosvětlené řídké, listnaté a smíšené lesy, řídké křoviny, porostní okraje na kamenitém a hlinitém podkladu
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá 15-20 cm dorůstající bylina
Kořen	tenké hnědé kořeny vyrůstající z oddenku
Listy	přizemní, řapíkaté, tuhé, kožovité, přezimující na rostlině do doby rašení nových listů (s květem či po odkvětu). Listy 3 laločnaté, na bázi srdčité, sytě zelené, kožovité, v průměru 5 - 10 cm velké, okraj laloků celokrajný
Květy	květy jednotlivé na jemně chlupatých načervenalých stonkách 5-20 cm vysokých, blankytně modré, zřídka růžové nebo bílé. 5-10 okvětních lístků nejčastěji elipčitého tvaru se zaoblenou špičkou. Pod květem listenovitý útvar připomínající kalich, úkrojky listenů celokrajní
Plody	krátce zobákovité nažky
Možnost záměny taxonu (+..	podobný <i>H. transsylvanica</i> (u nás nepůvodní) má hrubé zuby až laloky na okraji 3 četných listových laloků a malé zuby na špičce úkrojků listenů pod květem
Vytřvalost	spolehlivě vytrvalá, přezimující trvalka

Dlouhověkost	dlouhověká trvalka
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Únor
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	doba kvetení může být ovlivněna počasím příslušného roku a lokalitou pěstování
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě remontuje

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor vody	vlhké až čerstvé půdy, výrazné sucho nesnáší
Faktor půdy	živné, s podílem humusu, propustné
Faktor půdy - poznámka	mírně kyselé až mírně zásadité

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického účinku	v době kvetení
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin a A - Alpinum
Použití	zajímavý detail kvetoucích brzy na jaře, vhodný především do soukromých objektů
Růstové i jiné druhově specifické údaje	staré listy seřezat brzy na jaře před kvetením
Doporučený spon pro výsadbu	16 ks /m2

Množení

Odrůdy	Na trhu velká škála odrůd od druhu <i>H. nobilis</i> (např. <i>H. nobilis</i> var. <i>nobilis</i> s jednoduchým květem 'Feuerkäfer', 'Indigo Blue Strain', 'Odette', 'Schneesturm JP', s květem poloplňným až plným 'Andersen's Dream', 'Marion', 'Selisa', 'Seresa') a druhu <i>H. transsylvanica</i> ('Düvelsblau JP', 'Schwanensee', 'Supernova'). V roce 1898 prof. Friedrich Hildebrandt uvádí první hybridní odrůdy vzniklé křížením <i>H. transsylvanica</i> × <i>H. nobilis</i> pod označením <i>Hepatica</i> × <i>media</i> (např. 'Avatar', 'Blue Jewel', 'Mondsteinsonate'). Od 90-tych let vlna hybridizace, jejíž výsledkem jsou hybridní odrůdy uváděné pod označením <i>Hepatica</i> × <i>euroasiatica</i> (<i>H. transsylvanica</i> × <i>H. pubescens</i> 'Tenjinbai') - např. 'Prof. Freidrych Hildebrandt', 'Rötgesbütteler Röschen', <i>Hepatica</i> × <i>schlyteri</i> (<i>H.</i>
--------	---

maxima x *H. nobilis* var. *pyrenaica*) či jiné - např. *Hepatica* 'Dark Star' ((*H. nobilis* var. *japonica* x *H. transsylvanica*), 'Pink Pearl' (*H. yamatutai* x *H. transsylvanica*)

Ostatní

Odkazy

- Handel Andreas. Neue und besondere *Hepatica*. In Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2014. Ročník 40, číslo 1 s. 6-17. ISSN 0341-2105
- Kleinhans, G. Schönblättrige Selektionen des japanischen Leberblümchens. In Gartenpraxis. Stuttgart: Eugen Ulmer, 2004. Ročník 30, číslo 1 s. 21-23. ISSN 0341-2105.

Grafické přílohy

