

Taxon Omphalodes verna

Název taxonu	Omphalodes verna
Vědecký název taxonu	Omphalodes verna
Jména autorů, kteří taxon p...	Moench
Český název	pupkovec jarní
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Boraginaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Severní Itálie a Chorvatsko, druhotně rozšířen na mnoha místech střední Evropy a ve Švýcarsku

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké horské lesy
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	10 - 30 cm vysoká bylina kobercového růstu, rozrůstající se plazivými oddenky, dlouhými až 100 cm, pokrytý zbytky řapík. Z něho po odkvětu vyrůstají četné, plazivé, kořenující sterilní výběžky s růžicemi listů
Kořen	jemný vyrůstající z oddenků
Výhony	lodyha vystoupavá, 5 – 20 cm, v horní části chudě větvená
Listy	přízemní listy dlouze řapíkaté, řapíky 1 - 2x delší než čepel, která je na bázi klínovitá a ž srdčitá, 7 x 3 cm, zašpičatělá, přitiskle chlupatá. Lodyžní listy krátce řapíkaté, podlouhle kopinaté s klínovitou bází, ke květenství se zmenšující.
Květenství	řdký terminální vijan
Květy	stopečky květů 1 – 3 cm, koruna kolovitá, 5četná, v průměru 8 – 12 cm , modrá, zřídka bílá s bílými šupinami pakorunky
Plody	tvrdka
Možnost záměny taxonu (+..	Podobný O. cappadocica je méně rozrůstavý, list větší, protáhlejší (bzvláště sorta ´Cherry Ingram´, vysoký 10 - 15 cm, květ čistě modrý s bílým centrálním očkem
Vytvalost	spolehlivě mrazuvzdorný

Dlouhověkost	dlouhověký
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	období kvetení může být ovlivněno průběhem počasí.
Remontování	✓
Remontování - poznámka	slabě remontuje na podzim

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor tepla	odolný nízkým teplotám
Faktor vody	půda vlhká, svěží, k suché půdě tolerantní
Faktor půdy	zahravní, humózní

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky - pozná..	nenáročná, snadno pěstitelná, rychle rostoucí trvalka širokého použití
Použití	půdní pokrývy, podrosty, okraje porostů, stinné záhony, stinné partie zahrad, kořenové mísy stromů, skalky koruny suchých zídek . ve stinných a vlhkých místech
Růstové i jiné druhově spec..	velkou předností je rychlý růst spojený s velmi dobrou krycí schopností listů. Někdy může být až expanzivní v kombinaci s choulolistivými, málo vitálními druhy trvalek. Rostliny sázené ve sponu 25 x 25 cm již druhým rokem vytvoří 100% zapojený porost. Další předností taxonu je velmi brzké kvetení. Ideálním stanovištěm pro pupkovce je humózní, vlhká půda v lehkém přistínění korun stromů s tlející opadankou. Omphalodes verna je velmi tolerantní druh k různým typům půd, snese i sušší stanoviště a hlubší stín. Na slunci ho můžeme pěstovat za předpokladu trvalé a dostatečné závlahy.
Doporučený spon pro výsad..	12 - 16 ks/m2 - 100% zapojení ve 2. vegetační sezóně po výsadbě

Množení

Množení	Generativní, Vegetativní, Množení oddělky, Množení odkopky a „in vitro“ (mikropropagace)
---------	--

Množení - poznámka	semenem, dělením, řízkováním oddenků, in vitro
Odrůdy	Ne příliš prošlechtěný taxon - odrůdy 'Alba' - 15 cm, bílý květ. Elfenauge' - 20 cm, sv. modrá, 'Grandiflora' - výběr s velkými květy. O. cappadocica ('Cherry Ingram' - 40 cm s velkým, hořcově modrým květem na téměř černém řapíku, list 17 x 5 cm, 'Lilac Mist' - 20 cm s růžově-fialovým květem, 'Starry Eyes' - dvoubarevný atd.)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [A 1: záhon podél dřevěny, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	'Alba' - podzim 2015
Dodavatel	'Alba' - Trvalky - Batůškovi
Odkazy	• MUNCH, Michael. 2016 Gedenkemein. Gartenpraxis. (42)4, 8-13. ISSN 0341-2105.

Grafické přílohy



