

Taxon Kniphofia uvaria

Název taxonu	Kniphofia uvaria
Vědecký název taxonu	Kniphofia uvaria
Jména autorů, kteří taxon p...	Moench
Český název	mnohokvět
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Asphodelaceaea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Madagaskarská oblast a Kapská květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Rod zahrnuje asi 70 druhů vyskytujících se v jižní, jihovýchodní části Afriky a na Madagaskaru. Názvosloví pěstovaných rostlin obtížné, protože druhy snadno hybridizují (i v přírodě) a vykazují značné rozdíly v závislosti na podmínkách pěstování. , které se i v přírodě snadno.

Zařazení

Fytocenologický původ	travnaté stráně, podhorské louky
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálezelená
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá, polostálezelená - stálezelená bylina habitem připomínající hustý trs trávy
Kořen	krátce oddenkatá trvalka se silnými svazčitými kořeny
Výhony	květonosné lodyhy vzpřímené, tlusté, kulaté, hladké, bez listů dorůstající do 120 cm
Listy	lineární, pozvolna ke špičce se zužující v hustém přizemním trsu. Listová čepel tlustá s výrazným důlkem kolem středové žilky, okraj listové čepele jemně zoubkatý (drhne)
Květenství	hustý, vzpřímený válcovitý až do 20 cm dlouhý a 10 cm široký hrozen nad úrovní listů, nakvétající od spodu a s postupným nakvétáním jednotlivých květů měnící barvu z oranžové do žluté
Květy	trubkovité, krátce stopečkaté, směřující k zemi, v poupěti sytě oranžové, které s nakvétáním a odkvétáním blednou a přecházejí do žlutavých tónů, čímž se květenství jeví jako dvoubarevné
Možnost záměny taxonu (+..	obtížná identifikace velmi podobných druhů K. galpinii (drobnější, květenství téměř celé oranžové), K. tuckii (květenství slonovinové

	bělavé) a hybridů
Vytrvalost	problematická. Rostliny u nás nemusí spolehlivě přezimovat
Dlouhověkost	pokud je taxon dostatečně mrazuvzdorný jeho životnost je střední až dlouhá. U nás je ale výrazně ovlivněna nedostatečnou mrazuvzdorností. Ve výsadbách tudíž počítat spíše s krátověostí taxonu.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplé polohy
Faktor vody	mírně vlhké až suché půdy
Faktor půdy	propustné, živné, hluboké půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	solitera nebo skupiny
Růstové i jiné druhově spec..	taxon vyžaduje zimní ochranu - přisypání kompostu, nahrnutí listím, svázání listů proti vlhkosti a vyhnívání.
Doporučený spon pro výsad..	6-9 ks/m ² dle vzrůstnosti odrůdy

Množení

Množení	Generativní, Vegetativní, Dělení trsů a Množení oddělků
Odrůdy	Spíše než botanické druhy a jejich odrůdy (např. Kniphofia uvaria, K. uvaria 'Echo Mango', K. galpinii, K. citrina aj.) pěstují se hybridní taxony - např. červeno-oranžové 'Alcazar' (90 cm) 'Royal castle' (60-70 cm), oranžově-žlutá 'Moonstone' (100 cm), žlutá 'Sunninghane Yellow' (100-120 cm), 'Gelbe Flamme', POCO YELLOW (celá série POCO - kompaktní, 50 cm), bílá se zelenou špičkou - ještě nerozkvetlé květy 'Ice Queen' (100-120 cm), 'Pineapple Popsicle' (60 cm), 'Green Jade' (90 cm) aj.

Celky sbírek

- [O 31: štěrkový záhon / ZF - O - Experimentální zahrada -
záhony](#)
- [Labyrint zahrad / Unspecified \(ZO. 02 Anglická květinová
zahrada: 'Toffee Nosed' ZO. 08: Zahrada barev: 'Prince Igor
\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2015

Výsev/výsadba na stanoviš... ZO. 02 Anglická květinová zahrada: 'Toffee Nosed' - podzim 2015
ZO. 08: Zahrada barev: 'Prince Igor' - podzim 2015

Dodavatel 'Toffee Nosed', 'Prince Igor' - Agarden rostliny - Mnichovo
Hradiště

Grafické přílohy



