

Taxon Guzmania lingulata

Název taxonu	Guzmania lingulata
Vědecký název taxonu	Guzmania lingulata
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Mez (1896)
Český název	guzmánie jazýčkovitá
Synonyma (zahradnicky pou..	Guzmania lingulata var. splendens (C.D. Bouché) Mez; Guzmania cardinalis (André) Mez; Tillandsia lingulata L.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. lingulata
Nadřazená kategorie	Guzmania

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Neotropická květenná říše, Karibská oblast, Orinocká oblast, Amazonská oblast, oblast Guyanské vysočiny, oblast temperátních jihoamerických lesů, Paleotropická květenná říše a Indická oblast
Biogeografické regiony - po..	Střední Amerika, západní Indie, Kolumbie, Brazílie, Bolívie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Epifyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	nálevkovité růžice; široká nálevka až 70 cm v průměru, zadržující vodu
Výhony	zkrácený stonek
Listy	přízemní růžice dlouhých, kopinatých až čárkovitých, lesklých listů; zelené, hladké bez šupin, u báze hnědé, někdy s hnědými podélnými proužky, na konci zúžené do špičky
Květenství	jednoduchý nebo větvený klas s růžicovitě uspořádanými listeny; květenství vysunuto z nálevky na silném, až 30 cm dlouhém stonku s velikými svítivě červenými listeny
Květy	korunní plátky bílé; rostlina po odkvetení odumírá
Plody	tobolka
Semena	chmýřitá
Možnost záměny taxonu (+..	Guzmania lingulata var. concolor Proctor et Cedeno-Mald. (syn.

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světlé až polostinné stanoviště
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	teplý skleník; celoročně teplota 18 až 25 °C
Faktor vody	celoročně stejnoměrná vlhkost substrátu, vysoká vzdušná vlhkost; zálivka měkkou odstátou nebo dešťovou vodou do nálevky a časté rosení
Faktor půdy	hrubý rašelinný substrát s přídavkem zahradní zeminy; pH 5,0 - 5,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	větší okenní vitríny, vlhké a teplé skleníky a zimní zahrady, epifytní kmeny; krátkodobá dekorace okrasná květem do otevřeného interiéru
Choroby a škůdci	štítěnky, svilušky, kořenoví červci

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Množení oddělky
Množení - poznámka	oddělením dceřiných rostlin; výsev při teplotě substrátu 22-25 °C, semena nezakrývat, klíčí na světle

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/4300559?tab=references>

Grafické přílohy

