

Taxon *Apium graveolens* var. *secalinum*

Název taxonu	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.Alef.
Český název	celer naťový
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>secalinum</i>
Nadřazená kategorie	Apium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Středomoří
-------------------------------	------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro listy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce vytváří růžici listů, ve druhém roce 1,2- 1,5m vysoká květní lodyha
Listy	aromatické větší, lichozpeřené řapíkaté
Květenství	složený okolík
Květy	drobné, bílé
Plody	žebnatá dvounažka
Semena	HTS 0,3-0,5g
Vytrvalost	dvouletý

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	sklizeň jednotlivých listů nebo celé rostliny
-----------------------	---

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	650 mm srážek v době vegetačního období
Faktor půdy	hluboké humózní půdy, hlinité, vododržné, záhřevné

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	srdéčkova hniloba celeru, virová mozaika celeru (Celery mosaic virus- CeMV), septoriová skvrnitost listů celeru (Septoria apiicola), Korkovitost bulev celeru (Phoma apiicola), háďatko severní (Meloidogyne hapla)
Doporučený spon pro výsad..	0,4 x 0,3 - 0,4 m

Množení

Množení Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)