

Taxon Iris danfordiae

Název taxonu	Iris danfordiae
Vědecký název taxonu	Iris danfordiae
Jména autorů, kteří taxon p...	(Baker) Boiss.
Český název	kosatec Danfordové
Synonyma (zahradnicky pou..	syn. Iridodictyum danfordiae (Baker) Not hdurft, Xiphion danfordiae Baker.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Iris

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Turecko, Sýrie, Libanon, Izrael, Irák, Írán, Kavkaz

Zařazení

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Pěstitelská skupina - pozná..	Cibule se vysazují v září do hloubky 10-12 cm na dobře chráněná slunná stanoviště. Při výsadbě se nesmí poškodit dužnaté kořeny. Cibule špatně snáší přemokření, půda by měla být dobře propustná, vápenitá. Do výsadbové jamky je vhodné nasypat vrstvu říčního písku, sloužícího jako drenáž. Cibule by mohly být poškozeny silnějšími mrazy, a proto je vhodné místo výsadby přikrýt vrstvou rašeliny nebo suchého listí. V době růstu vyžadují rostliny dostatek vláhy a přihnojování, po odkvětu naopak sucho. Cibule by se měly na jednom stanovišti ponechat 3-5 let, aby měla rostlina možnost vytvořit hustý trs. Rostlina po odkvětu brzy zatahuje a zcela zmizí z porostu.
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Lodyha je silně zkrácená, listy vyrůstají ve stejné době jako květy, listy jsou čárkovité, čtyřhranné a zašpičatělé, po odkvětu se výrazně prodlužují.
Kořen	Kořeny jsou svazčité.
Pupeny	Pupeny jsou umístěny na bázi cibule.
Listy	Listy čárkovité, čtyřhrané a zašpičatělé.

Květy	Květy jsou jednotlivé a sytě žluté.
Plody	Plodem je tobolka.
Vytrvalost	V optimálních podmínkách dobře vytrvalý.
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben
Remontování - poznámka	Neremontuje.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor vody	V době vegetace vyžaduje optimální vlhkostní podmínky v půdě, ale v době vegetačního klidu vyžaduje sucho.

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	Březen a duben.
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů)
Použití	Tyto druhy kosatců patří na jaře k prvním kvetoucím rostlinám v zahradě. Vysazují se tedy na dobře viditelná místa v blízkosti cest, na skalky a do přírodě podobných vegetačních prvků, do volných slunných ploch a do ploch stepního charakteru.
Choroby a škůdci	V ČR netrpí chorobami ani škůdci.
Doporučený spon pro výsad..	10 x 10 cm

Množení

Množení - poznámka	Množení je možné dceřinými cibulkami nebo výsevem semen do písčitého substrátu.
--------------------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [D 10: záhon u zadního vchodu budovy D - u... / ZF - D - Výsadby v okolí budovy D](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... D10: podzim 2015

Dodavatel D10: Jošt Import

Grafické přílohy

