

Taxon Malus domestica ‘Zuccalmagliova reneta

Název taxonu	Malus domestica ‘Zuccalmagliova reneta’
Vědecký název taxonu	Malus pumila var. domestica
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	‘Zuccalmagliova reneta’
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnicky pou..	Reinette de Zuccalmaglio', ‘Malus von Zuccalmaglios Renette', ‘Zuccalmaglio'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Německo, Grevenbroich v Porýní 1878, Dietrich Ulhorn
-------------------------------	--

Zařazení

Fytocenologický původ	kříženec ‘Ananasova reneta’ x ‘Purpurové agátové’
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruny jsou zpočátku širší, jehlancovité, později vysoce kulovité, pravidelné, hustší, větve jsou nasazeny v ostrém úhlu
Výhony	středně dlouhé, u mladých stromů jsou silné, u starších stromů slabé, tvarově mírně kolénkovité, internodia kratší, nestejněměrná, barva je tmavěji hnědá, ve stínu nazelenale hnědá, vrcholek je silně ochmýřený, ostatní část stříbřitě ožíněná, lenticely jsou drobné, velmi řídké, světlé, málo nápadné
Pupeny	pupeny jsou malé, přisedlé, značně plstnaté, sedící na malých, nižších patkách, s žebry jen naznačenými, květní pupeny středně velké, kuželovité, přišpičatělé, šupiny červenavě žilkované, ke špičce značně plstnaté
Listy	malé, drobné, vejčité až protáhle eliptické, asymetrické, zelené, málo lesklé, rub nepatrně ochmýřený, okraj čepele nepravidelně jednoduše i dvojitě pilovitý
Květy	středně velké, široce miskovité, korunní plátky jemně narůžovělé, eliptické, miskovitě prohnuté, okraje málo zvlněné, vzájemně se mírně překrývající, blizny mírně přesahují úroveň prašníků; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou ‘Baumannova reneta’,

	‘Berlepschova reneta’, ‘Boikovo’, ‘Coxova reneta’, ‘James Grieve’, ‘Landsberská reneta’, ‘Oldenburgovo’, ‘Parména zlatá’
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velmi proměnlivé, vysoce kulovité až vejcovité, menší až středně velké, slupka hladká, pololesklá, mírně mastná a pevná, základní barva citrónově žlutá, dužnina žlutavá, křehká
Možnost záměny taxonu (+..)	Habitus koruny, drobnější listy se zvlněným okrajem, tvar a zejména vybarvení plodů s nápadnými lenticelami, které jsou u velkých plodů ohraničeny červenými dvůrkami.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně raná

Doba zrání

Doba zrání - poznámka polovina října (skladovatelnost do března)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla proti mrazům je ve dřevě málo odolná a byly pozorovány poškození v každé tvrdší zimě

Faktor půdy nesnáší suché a přehnojené půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vhodná jen pro nízkokmeny; čtvrtkmeny na semenáči nebo A2 a M 11, zákrsky na M 1, 2 a 4, větvenovité zákrsky na M 4 a 2, jen výjimečně jako doplněk v sadech na M 9, pro ovocné stěny se nehodí

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci proti strupovitosti a padlí jen středně odolná, na vlhkých místech stromy trpí rakovinou

Růstové i jiné druhově spec.. v mládí střední, ale velmi brzy ustává, až je později velmi slabý a je nutné jej podporovat, po zakrácení dosti dobře obrůstá ponejvíce delším plodonosným obrostem

Plodnost raná, zpočátku pravidelná, později má však tendenci ke střídavé plodnosti, celkově je velmi úrodná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Vyniká úrodností, ostatní vlastnosti jsou jen průměrné a neodpovídají požadavkům na tržní odrůdu. Vysoké nároky na půdu a agrotechniku, drobné plody, malá mrazuvzdornost, jen průměrná odolnost proti chorobám, málo vyhovující vzhled.

Grafické přílohy

