

Taxon Vitis vinifera Bronner

Název taxonu	Vitis vinifera Bronner
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Bronner’ (Br)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	FR 250-75
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o německou odrůdu, vznikla křížením ‘Merzling’ x (‘Saperavi severnyj’ x ‘Svatovavřínecké’)

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	větší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, nejčastěji uzavřený; povrch listu je vrásčitý, vespod lehce plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký hrozen, kuželovitý, hustý; bobule je malá, kulatá, žlutozelená s hnědými tečkami
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až nižší
Faktor vody	méně vhodné jsou příliš suché půdy
Faktor půdy	nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na tažně
Podnož	pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, Binova i CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	vyšší odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	spíše pozdní, pravidelná (výnos 9-15 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je podobné Rulandskému bílému
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková vína

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 94\)](#)

Grafické přílohy

