

# Taxon Vitis labrusca diana

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis labrusca diana                    |
| Vědecký název taxonu           | Vitis labrusca                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ´Diana´ (Di)                            |
| Český název                    | réva liščí                              |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                         |
| Biogeografické regiony - po.. | americká labrusková odrůda, vznikla z volného opylení odrůdy ´Catawba´ |

## Zařazení

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Pěstitelská skupina | Moštová odrůda |
| Životní forma       | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus          | středně bujný až bujnější růst                                                                                                                                      |
| Výhony           | jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávajících                                                                                                  |
| Pupeny           | menší, špičaté                                                                                                                                                      |
| Listy            | středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch vrásčitý, vespod lehce plstnatý |
| Květenství       | lata                                                                                                                                                                |
| Květy            | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                                             |
| Opylovací poměry | Samosprašná                                                                                                                                                         |
| Plody            | menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, volnější, na krátké stopce; bobule je středně velká až velká, kulatá, světle růžová, ojíňená                        |
| Semena           | středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem                                                                                                                       |
| Kůra a borka     | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                                                    |
| Vytrvalost       | ano                                                                                                                                                                 |
| Dlouhověkost     | ano                                                                                                                                                                 |
| Doba rašení      | Na jaře rašící (IV)                                                                                                                                                 |

## Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Květen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

## Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Říjen |
| Konec doby zrání   | Říjen |

## Nároky na stanoviště

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                        |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění               |
| Faktor tepla             | teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá       |
| Faktor vody              | lépe lehčí, ale humóznější půdy          |
| Faktor půdy              | úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                        |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                      |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | vysoké i střední vedení                                                         |
| Řez             | na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez                                       |
| Podnož          | do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4 |

## Užitné vlastnosti

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová až stolní odrůda - výroba burčáku i lehčího bílého až narůžovělého vína, přímý konzum |
| Choroby a škůdci | vyšší odolnost k houbovým chorobám                                                                 |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 6-9 t/ha)                                                                |

## Množení

|                             |                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                           |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací                                         |
| Popis vína                  | víno je bílé až slabě narůžovělé, silně aromatické, vonící po lesních jahodách, s vysokou kyselinou |
| Doporučená technologie vína | burčák, stolní, jakostní a přívlastková červená vína, kupáže                                        |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 93, 132\)](#)

