

# Taxon Vitis vinifera Malverina

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Název taxonu                   | Vitis vinifera Malverina                |
| Vědecký název taxonu           | Vitis vinifera                          |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Linné</a>                   |
| Odrůda                         | ‘Malverina’ (Ma)                        |
| Český název                    | Réva vinná pravá                        |
| Synonyma (zahradnický pou..    | BV-19-143                               |
| Autor                          | Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Odrůda</a>                  |
| Vnitrodruhové jednotky         | vinifera                                |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Vitis</a>                   |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony        | Kulturní původ                                                                                                                         |
| Biogeografické regiony - po.. | jedná se o českou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Rakiš’ (Villard blanc x Veltlínské červené rané) x ‘Merlan’ (Merlot x Seibel 13 666) |

## Zařazení

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Fytocenologický původ | původní odrůda |
| Pěstitelská skupina   | Moštová odrůda |
| Životní forma         | Fanerofyt      |

## Popisné a identifikační znaky

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habitus                    | dle vedení, má středně bujný růst                                                                                                       |
| Výhony                     | jednoleté réví je středně silné, světlejší, šedohnědé, dobře vyzrávající                                                                |
| Pupeny                     | středně velké, zahrocené                                                                                                                |
| Listy                      | středně velké, slabě pětilaločnaté s mírnými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, lehce překrytý; povrch listu je světle zelený, hladký |
| Květenství                 | lata                                                                                                                                    |
| Květy                      | oboupohlavné, pětičetné                                                                                                                 |
| Opylovací poměry           | Samosprašná                                                                                                                             |
| Plody                      | středně velký, kuželovitý, hustší hrozen s křídélky; bobule kulatá, malá až středně velká, zelenožlutá na osluněné straně červenošedá   |
| Semena                     | středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem                                                                                           |
| Kůra a borka               | šedé barvy, odlupuje se v pásech                                                                                                        |
| Možnost záměny taxonu (+.. | ‘Savilon’, popř. ‘Vesna’ (Ma má žluzelené bobule s růžovošedým                                                                          |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
|              | líčkem)             |
| Vytrvalost   | ano                 |
| Dlouhověkost | ano                 |
| Doba rašení  | Na jaře rašící (IV) |

### Doba kvetení

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení   | Červen |

### Doba zrání

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Začátek doby zrání | Říjen |
| Konec doby zrání   | Říjen |

### Nároky na stanoviště

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce   | ✓                                                                     |
| Faktor světla - poznámka | vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)             |
| Faktor tepla             | teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá                 |
| Faktor vody              | příliš vlhké, jílovité a naopak i suché písčité půdy jsou méně vhodné |
| Faktor půdy              | lépe vlhčí hlinité či hlinitopísčité půdy                             |
| Faktor půdy - vápnomilný | ✓                                                                     |
| Faktor půdy - poznámka   | ovlivňujeme podnoží                                                   |

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost vedení | střední až vysoké vedení                                                                                                 |
| Řez             | na dlouhý tažeň                                                                                                          |
| Podnož          | do hlubších humóznějších půd SO 4, CR 2 a Kober 125 AA, do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože LE-K/1 i Kober 5 BB |

### Užitné vlastnosti

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Použití          | bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum   |
| Choroby a škůdci | vysoká odolnost k houbovým chorobám, je napadána roztoči |
| Plodnost         | pozdní, pravidelná (výnos 10-15 t/ha)                    |

### Množení

|                             |                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Množení                     | Roubování                                                                                                   |
| Množení - poznámka          | dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací                                                 |
| Popis vína                  | vůně vína je ovocná, jemně kořenitá; chuť je kořenitá po vanilce a skořici, s příjemnou hořčinkou v dochuti |
| Doporučená technologie vína | jakostní a přívlastková bílá vína, sur-lie, barrique                                                        |

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 92, 16\)](#)

## Grafické přílohy

---



