

Taxon Scilla siberica

Název taxonu	Scilla siberica
Vědecký název taxonu	Scilla siberica
Jména autorů, kteří taxon p...	Haw.
Odrůda	‘Alba’
Český název	ladoňka sibiřská
Synonyma (zahradnický pou..	Scilla praecox Donn
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Scilla

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz, západní Asie - Turecko, Írán, Irák, východní Evropa - Rusko, Bělorusko, Ukrajina

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Životní forma - poznámka	Z jedné cibule raší dva až tři sytě zelené, kápovitě ukončené listy a hranaté stonky nesoucí několik k zemi skloněných kvítků nejčastěji jasně modré barvy. Barva květu však v přírodě lavíruje mezi odstíny modré a fialové barvy.
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Ladoňky patří k poměrně nenáročným cibulovinám rostoucím dobře na plném slunci i v mírném polostínu. Cibulky se vysazují v průběhu září nejlépe v menších skupinách do hloubky 5-8 cm pod povrch půdy. Na jednom stanovišti mohou zůstat mnoho let. Ladoňky patří k poměrně nenáročným cibulovinám rostoucím dobře na plném slunci i v mírném polostínu. Cibulky se vysazují v průběhu září nejlépe v menších skupinách do hloubky 5-8 cm pod povrch půdy. Na jednom stanovišti mohou zůstat mnoho let. Chceme-li je přesadit, provedeme to nejlépe hned po zatažení listů, ke kterému dochází krátce po odkvětu. Většina střeoevropských a asijských druhů je dobře mrazuvzdorných. Chceme-li je přesadit, provedeme to nejlépe hned po zatažení listů, ke kterému dochází krátce po odkvětu.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Ze světlé cibule vejčitého až kulovitého tvaru vyrůstá růžice podlouhlých, žlábkovitě prohnutých, dlouze pochvatých listů s kápoitou špičkou a z jejich středu raší jeden nebo více lysých květních stonků nesoucích hroznovitá květenství. Stopky květů jsou u některých druhů podepřeny listeny. Květ bývá nejčastěji široce otevřený, hvězdčovitý až zvonkovitý tvaru ve středu s výraznými tyčinkami a pestíkem. Velikost květu a množství květů v květenství je u jednotlivých druhů velmi rozdílná. Květy jsou nejčastěji v odstínech modré a fialové barvy.
Kořen	Kořeny svazčité vyrůstající z podpučí cibule.
Pupeny	Jsou uloženy na podpučí cibule
Květenství	V jednom květenství vykvétá v březnu a dubnu okolo pěti květů.
Plody	Plodem je kulovitá tobolka.
Doba rašení	Na jaře raší (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci	Rostliny mohou být napadány několika houbovými chorobami, které však obvykle nezpůsobují větší škody. Cibule mohou být napadány chorobami z rodu Botrytis, Penicillium, Sclerotium viz. Tulipa L.
Doporučený spon pro výsad..	15 x 15 cm

Množení

Množení - poznámka	Většina ladoněk se množí velmi dobře pomocí dceřiných cibulek a v dobrých podmínkách také samovýsevem. Semena po zahradě roznášejí mravenci, proto rostlinky často rozkvétají na překvapivých místech.
Odrůdy	‘Alba’

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [O 33: konteinerovna a stínoviště u... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)

Celky sbírek - poznámka

C3 - výsadba odrůdy 'Alba' v X/2014

Grafické přílohy

