

Taxon Sorbus aucuparia

Název taxonu	Sorbus aucuparia
Vědecký název taxonu	Sorbus aucuparia
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	jeřáb obecný
Synonyma (zahradnický pou..	Pyrus aucuparia
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Sorbus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Arktická oblast, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	horské a podhorské lesy

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	strom, méně často keř 5-15 m vysoký, koruna vejčitá až kulovitá, na obrysu nepravidelná, vzdušná, rychle rostoucí
Kořen	kotevní
Výhony	jen v mládí chlupaté, později lysé, červenohnědé až hnědošedé, s mnoha lenticelami
Pupeny	vejčitě kuželovité až kuželovité, černohnědé, plstnaté až olysávající, nelepivé
Listy	zpeřené, s 9 - 11 - 19 lístky. Lístky 2,5 - 6 (-9) cm dlouhé, oválné až podlouhle kopinaté, báze asymetrická, vrchol špičatý, okraj pilovitý nebo pilovitě zubatý, líc tmavě zelený, lysý, matný, rub světle šedozelený, pouze v mládí chlupatý
Květy	5-18 cm v průměru, ploché, husté, mnohokvěté
Plody	malvice,(4 -) 6-9 mm v průměru, kulovité, oranžově červené až červené, kalich vytvářelý
Kůra a borka	světle šedá, dlouho hladká s velkými lenticelami
Možnost záměny taxonu (+..	Fraxinus ornus (list celokrajný plody suché nažky)
Dlouhověkost	krátkověká

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu

Doba zrání

Doba zrání - poznámka	plodí v srpnu až září
-----------------------	-----------------------

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilný, snese přístín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblasti II-IV, hlavně v mládí mrazuvzdorný, celkově nenáročný, pionýrský
Faktor vody	suchovzdorný
Faktor půdy	na půdy nenáročný, spíše propustné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	na podzim barví žlutě až tmavě červeně
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	doplňková, meliorační, alejová dřevina, pro zalesňování imisních holin
Růstové i jiné druhově spec..	výrazný květem, plodem držícím dlouho do zimy, podzimním zbarvením listů

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Dřevité řízky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	slouží jako podnož pro druhy se zpeřenými listy
Odrůdy	‘Dirkenii’ - listy zpočátku zlatožluté, později zelené; ‘Fastigiata’ (syn. f. pyramidalis Hort.) - sloupovitého vzrůstu, 5 – 8 m vysoký, ‘Rossica’ - vzrůst shodný s typem, ale listy a plody větší. Lísky o trochu širší než u typu, ve spodní třetině celokrajné

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)

