

Taxon Vitis vinifera Aligote

Název taxonu	Vitis vinifera Aligote
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Aligoté´ (Ali)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Aligote, Carcarone, Melon de Jura, Vert Blanc
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starší francouzská odrůda, vznikla pravděpodobně spontánním křížením odrůd ´Pinot´ a ´Heunisch weiss´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	menší až středně velké, zahrocené
Listy	středně velké, třílaločné s mělkými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je mírně vrásčitý, vespod lehce plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule kulatá malá až středně velká, žlutozelená s černými tečkami
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Ryzlink rýnský´ (Aligote má spíše válcovitý hrozen)

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody	vlhké, jílovité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	méně náročná odrůda na půdy, lépe lehčí půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	většinou SO 4, CR 2 či 125 AA, dle půdních podmínek a vedení

Užitné vlastnosti

Použití	bílá mošťová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	citlivější k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 7-11 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno má ovocnou vůni i chuť s výraznějšími kyselinami
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, sekty

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 30\)](#)

Grafické přílohy

