

Taxon Vitis vinifera

Název taxonu	Vitis vinifera
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	réva vinná
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	pravděpodobně Kavkaz, Středozeří a Blízký Východ

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavá liána, vysoká 15-30 m
Výhony	letorosty žlutohnědé až červenohnědé, úponky dvouramenné
Listy	listy dlanitě 3-7laločné až 3-7dílné, okrouhlé, u řapíku úzce vykrojené, 5-18 cm v průměru, laloky hrubě zoubkované, líc lysý, rub bělavě vlnatý až plstnatý, báze srdčitá, s 5 žilkami, postranní žilky ve 4-5 párech, řapíky 4-9 cm dlouhé
Květenství	květy ve složených hustých až řdkých latách až 15-20 × 6 cm velkých
Květy	květy žlutozelené, 5četné
Plody	bobule podlouhlé až kulovité, tmavě modré, fialové, červené i zelené, 6-25 mm dlouhé, 1-4semenné
Kůra a borka	borka nahnědlá a v pruzích se odlupující

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Červenec
--------------------	----------

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	středně vlhké až sušší půdy
Faktor půdy	propustné půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	Řežeme mimo období, kdy táhne mizu. Řeže se v zimě (leden, únor) a v létě. Zimní řez se provádí na jednoletém dřevě za 6. až 8. pupenem. Letní řez je prosvětlovací.
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	léto, podzim - plody, červený barvič
Choroby a škůdci	rzi a plísně, zobonoska révová, pokud pěstujeme jako ovocnou dřevinu, tak i ptáci

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Dřevité řízky a Očkování
Množení - poznámka	množíme ze semene, dřevitými odřezky i očkovými odřezky jako všechny révy